

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元蕭其昌集卷之八

太醫院吏目金鈺雲林葉廷賢子才著

男葉承國

葉承國分校

南瀛大學學生蕭即周文卿校刊

小兒科

○小兒形色論

論歌脉症十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒三四歲為孩兒五六歲為小兒七八歲為童兒九歲為童子十歲為稚子矣小兒半歲之間有病當於額前有青髮際之間以名中食二指輕手滿額按之兒頭在左用右手在右用左手食指為上中指為中名指為下若二指俱熱主感受風邪鼻塞氣粗發熱然嗽若三指俱冷主外感內傷發熱吐瀉若食中指熱主上熱下冷各

市指熱主火驚食指熱主肺肺氣滿乳食不消又要觀形察色假如形
 之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白
 腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看稟賦本而治之無不可也

○月間審候歌

觀形察色辨因由

陰弱陽強髮硬柔

若是傷寒雙足冷

要知有熱肚皮求

鼻冷便知是瘧疹


耳冷應知風熱症

滿身皆熱是傷寒

上熱下冷傷食病

○觀形察色面目圖

眼胞絡屬脾 赤主肝有熱
 眼烏珠屬肝 青主肝有熱
 眼瞳人屬腎 不瞤時腎虧
 眼尾角屬心 紅主心有熱
 眼白睛屬肺 白主肺受寒



左腮屬肝
 右腮屬肺
 額屬心
 鼻屬脾
 頤屬腎

觀面部

左腮屬肝其色青者為順白者為逆若色赤主肝經風熱發熱拘急青黑主驚風腹痛淡赤主潮熱痰嗽

右腮屬肺其色白者為順赤者為逆若赤色甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤澀或淋閉不通

額上屬心其色赤者為順黑者為逆若青黑主驚風腹痛瘰癧啼哭微黃主盜汗頭髮乾燥驚悸骨蒸

鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便閉而鼻燥衄血

頰屬腎其色黑者為順黃者為逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

又

面赤心家熱	面黃脾有積	面白肺家寒	面青肝有風
唇赤心家熱	唇黃脾有積	唇白肺虛寒	唇燥脾有熱

喘白肺有驚

金匱腹中痛

承漿黃土吐青主驚

黃如土食糧

熱甚眼朦朧

傷寒色紫紅

丁巳

虎占三關脈紋圖

虎占三關脈紋圖

虎口又手處是也。三關在第二指
反看三節第一節風關第二節名
氣關第三節名命關



○脉指歌

小兒食指辨三關男左女右一般看皆知初氣中風候末是命門易亦難
要知虎口氣紋脈倒指看紋分五色紅黃紫赤青五臟和紅紫依稀有損
益紫青傷食氣虛煩青黑之時証候迥忽然純黑在其間好手醫人心
膽寒若也直上到風關粒米短長分兩端如鎗衝射驚風至分作枝叉
有數般只反裏順外為逆順逆交連病已難又頭長短尤可辨如此醫
人仔細看初看掌心中有熱便知身體熱相從肚熱脚冷傷積定脚熱
額熱是感風額冷脚熱驚所得瘡疹發來耳後紅孩兒無事忽太早不
是驚風是天熱大吐氣促長聲驚誤吃熱毒悶心竅急須吐下却和脾
若將驚藥真堪笑痢疾多氣冒頭癢不努不嘔腸有風冷熱不調分亦

白脫肚因毒熱相攻十二種痢何爲惡禁口刮腸大不同孩兒有病不可下不熱自汗兼自瀉神困煩陷四肢冷乾嘔氣虛神怯怕明翻白眼毛焦穗疳氣潮熱食不化鼻塞咳嗽及虛痰脈細腸鳴煩燥訝方將針積與疎通下了之時必生詫孩兒實熱下無華面赤睛紅氣壯強脈大弦洪肚上熱肝腮喉痛尿如湯屎硬腹脹脇肋滿四肢浮腫夜啼長遍體生瘡肚隱痛下之必愈是爲良

○小兒脈理

小兒一歲變蒸已足左有脈見寸口而生子見小兒初生未滿月手望高骨之際亦有脈息吸吸而動脈者氣血之波瀾既生乃成人必有氣血焉得無脈只不比大人察其端的之之意也

○小兒脈歌

小兒有病須憑脈一指三關定息數遲冷數熱古今傳淨風沉積當先識左手入迎主外証右手氣口主內疾初候風寒暑濕侵以候乳食痰積

致則紫無汗是傷寒初發傷風有汗液洋洋多是風熱盛沉細元因氣
食積沉緊腹中痛不休弦緊喉間作氣急紫促之時疹症生緊數之際
驚風至劇軟慢驚作瘰癧喉間風癰發搖擗軟而細者為疳蟲中而實
者因便閉脈洪大小便中血崩漏有氣兼驚悸滑主濕濕冷所傷敗志
客忤若須訖大小不勻為惡候二至為胎三至至五至為胎四至至六至
至平和曰無疾七至八至病尤輕九至十至病勢急此訣萬中無一

○小兒五臟主病脈歌

心脉

心脉浮數驚悸熱

傷胃焦暗明白訣

吊腸疝氣及盤腸

壅結口瘡小腹痛

心脉沉遲臍腹寒

諸氣有冷痛難當

小便頻數腸中冷

下指端詳仔細看

肝脉

肝脉浮數定主風

目赤翳膜又主筋

流淚出血眼生翳

或痒或痛怕羞明

脾脉

肺脉

腎脉

肝脉沉遠主有寒

面青唇白眼眇張

諸病俱以慢風候

良醫仔細要察脾

脾脉浮熱熱痰涎

能食胃惡脾臟堅

滯順口瘡停壅結

唇紅臉赤胃中熱

脾脉沉遲主風吹

更加吐瀉慢脾傳

氣虛胃弱不能食

滯順嘔惡醒脾也

肺脉浮數主便血

傷寒咳嗽遍身熱

氣急痰盛或癰疹

瀉痢潮熱太腑溢

肺脉沉遲主虛寒

臟腑滑腸或酒泄

仍有咳嗽與痰涎

下根不定即無根

腎脉浮數實有熱

偏隆膀胱痛又赤

口鼻咬亦是腎驚

停身齒內出鮮血

腎脉沉遲定有寒

臟腑停留入腎囊

偏隆膀胱尤不痛

光浮虛火最難當

○小兒死症真訣

黑色如針懸眼下，虛醫也。須怕忽然腹痛、鼻青時，不必更求醫。青色環口，橫入耳，此候必死。次黑色繞口，及連目，看者定，不足黑起眉間，也不良。十日必然亡。人中黑色入口，來孩子入泉，埋水腫之病，準頭黑，殺君腎氣滅，咳嗽切忌白入眉，肺絕。要君知，孩子吐時鼻色白，命斷難再得中。風切忌面如粧，焉能得久長。目炯無光，兼直視，必定三朝死。更有睡人不動時，死候要君知。目似開，如又不開，是死之媒。口禁全然，不進乳。此病終不起，瀉下之物如溺血，孩兒不得活。長吐不止，止又吐，床裏勞心，顛刺久不食，更啖入終與死為隣。瀉下不歇，歇又來，指目下，目白，小便艱難，又太渴，畢竟難得活。太便用藥，全不通，通也無功。耳上生瘡，黑斑出，醫人無此術。久嗽四肢皆逆冷，無由難得醒。體熱多，應睡不醒。休要費精神，痘疹出後，熱不退，此候應為害。下藥再熱不止時，不用藥。

良醫外遇之後加燥渴命必難得活腹腫脹時氣又虛終久命不延

○小兒死候形症

太衝無脉滿口粘涎身出黑汗舌縮生瘡五心口腫瀉出黑血丹毒遍身
消止又瀉直視看人面黑狂燥驚叫咬入吐瀉不止魚口氣急唇乾黑
燥忽作鴉聲啼哭無淚兩眼半開四肢癱瘦氣喘無煙肝大青筋四肢
逆冷汗珠不流唇反舌縮用手撮入搖頭動項頰門作坑涎如牽絲拘
腰凸肚鼻內氣冷患者皆死已上並是死候難以醫療不可順情

○看兒眼法

小兒諸病但見兩眼無精光黑精無運轉目睛無精芒如魚眼瞽眼之狀
箇箇不治或神藏於內外若昏困者無妨其有病焉而眼中神氣不脫
者可以活眼者五臟本腑神氣之所發神氣已脫脈雖僅存亦未能保
○相兒命短長法

兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽

啼聲散不成人。

臍小者不壽。

衣大者壽。

汗血者多死，不壽。

頭四破不成人。

早坐早行，早齒早語，皆惡性，非佳兒。

髮稀少者，強不聽人。一作不聰。

兒生枕骨不成者，能言而死。

掌骨不成者，能匍匐而死。

脛骨不成者，能立而死。

魚口者死。

頭下破者死。

陰囊下白者死。

啼聲深不成人。

通身軟弱，如無骨者，不壽。

自開自者，不成人。

汗不流，不成人。

常搖手足者，不成人。

臍中無血者好。

目視不正，驚動者，大非佳。

小便疑如脂，骨不成人。

頭毛不周，面者，不成人。

額上有旋毛者，早貴，妨父母。

尻骨不成者，能偃而死。

踵骨不成者，能行而死。

身不收者死。

股間無生肉者死。

陰不起者死。

如縫通達黑者，壽。

○急驚馬

脉訣啓蒙曰。小兒脉促急爲虛驚。○直挺不溺數洪緊爲急驚。○沉遲散緩爲慢驚。○虎口脉紋青紫爲驚風。○紅者風熱輕。○赤者風熱盛。○青者驚積。○紫者驚熱。○青紫相半驚積風熱俱有。主急驚風。○青而淡紫伸縮來去主慢驚風。○紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出而不出主慢脾風。○形勢潛入裏者順。○出外者逆。

夫急驚風者因內有鬱熱外挾風邪心家受熱而發驚肺家生風而發熱夫木制在金火盛則金受尅金衰不能平木木能生火火得風則煽煽起故子母縱橫血亂氣併痰涎壅塞關竅不通風火著盛而不得泄揚烈而盛急驚也其症牙關緊急壯熱溼潮竅視反張搐搦攣動唇口俱眼賊引頻併六脈浮散洪緊治先搐鼻通關痰涎壅盛以吐風散吐一次用敗毒散保命丹或雄黃解毒丸下之驚退而神志未定投安神散

一但噴嚏不下通降不隨眼睛審轉口中出血兩足擺跳肚腹痛助或視
緩而摸床尋衣症篤而神昏氣促心中熱痛忽大呼聲者不治
噴嚏散

半夏

牙皂

等分全藥用豆許吹入鼻中

○一論小兒急慢驚風發熱口噤不少人事手心伏熱痰涎咳嗽上壅喘
急並宜湧法

吐風散

全蝎炒一箇瓜蒂炒十箇赤小豆三十箇

右爲末每二歲兒服一字溫米飲調下未吐再服

○一論小兒急驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症并一切感冒風寒
頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重及痘疹欲出發搐并時行瘟疫等症宜
加味敗毒散

羌活

獨活

前胡

紫胡

白茯苓

去皮人參

枳殼煨熟桔梗

天麻

全蝎

姜蚕

白附子

地骨皮

川芎

甘草

右作二劑生薑三片水煎熱服

○一論小兒急驚搐搦眼番口噤搖頭天吊痰嗽喘熱服
南極壽星湯

膽星

防風

白附子

蟬退

薄荷

甘草

右剉水煎服

○一論小兒潮熱驚啼

木通

車前

赤茯苓

麥門冬

蟬退

防風

白芍

甘草

燈草

水煎服

○一論小兒驚風咳嗽痰喘

天南星

一箇大者炮去裂爲末每服一錢生薑三片水煎溫服

○一論小兒胎驚內串肚腹堅硬目睛上視手足搐搦用弓反張痰嗽喘

熱一切急慢驚風並皆治之

至聖保命丹

南星

炮去皮用白粉水浸一宿取出乾再用生薑水浸一宿晒乾再少

半夏

同上製青黛

薄荷

各一兩

全蝎

去尾尖

天麻

白附子

畧炒

姜蚕

姜汁炒

防風

鬱金

甘草

各五錢

麝香

少許

朱砂

為末五錢

右為細末煉蜜為丸朱砂為衣次實大每服一丸燈心薄荷湯化下

○一論小兒痰喘急慢驚風至死但能開口灌下無不活者用

千金散

內閣秘傳

全蝎

炙熟

直姜蚕

各三

朱砂

四分

牛黃

六釐

冰片

天麻

黃連

各四分

膽星

甘草

各二分

右為末每服五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○一論驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑

安神散

人參

茯苓

去心

遠志

去心

天麻

白附子

麥門冬

去心

金鰲

去尾

連肉

茯神

去皮

朱砂

各等分

右爲細末每服燈心湯調下

○一小兒沉困發熱驚搐不乳視其脈紋如亂魚骨此風熱急驚之症也先用抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡壯脾平肝遂熱退而驚定愈矣

○一小兒痰癆啼呌額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯加木香柴胡釣藤鈎啼呌漸緩更加當歸又下劑而安

○一小兒目內色青發搐目上視呌哭不已或用牛黃清心丸不愈反呌牙頻悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯及六味地

慢驚

夫慢驚風者因外感風寒內傷乳食而作吐瀉或得大病之餘或誤吐下

之過脾胃兩虛脾與肺母子也母虛亦令子虛而生粘痰胃虛則能生風風能動能開故其症目偏喜開痰滯咽喉如牽鋸狀口鼻氣冷唇緩面青涎流口角將復癰癰是也治宜祛風活痰健脾生胃不可妄用腦麝巴粉等藥其有眼閉四肢厥冷者名曰慢脾風極危為速用回陽之藥手足漸溫復以醒脾散理之其服藥不効太衝脉尚有者灸百會穴但面黯神慘魚口鴉聲胃痛脇動身冷粘汗頭搖髮直睛定口瘡喘噤尸卧唇縮氣麤者不治也

加味和中散

治小兒慢驚風

人參

白朮

去蘆各一錢

白茯苓

去皮

陳皮

各五分

半夏

全蝎

炒五分

天麻

七分

細辛

三分

薄荷

甘草

右剉一劑生薑棗煎服乳母亦宜服之

○一論小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沈默默不食宜

醒脾散

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮 木香

金蝎

姜蚕

白附子

天麻

甘草

○一方去天麻姜蚕加泡南星半夏炮陳倉米二百粒水煎旋旋服之
右劉生薑三片棗一枚水煎服

○一論慢驚乃元氣虛損而至昏愎急灸百會穴若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療此因脾虛不能攝涎而作痰也此方專治慢驚涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱宜用

紫金錠子

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮

白茯神 去皮 山藥炒

乳香

赤石脂 煅 辰砂 各三錢

麝香 一錢

右為細末以糕下兩為丸如彈子大金箔為衣每下粒薄荷湯研化服
○一小兒嘔吐不食手足搐搦痰涎上壅手足指冷額黑唇青此腎水勝

心火也。用五味異功散加木香炮姜頓安。乃去炮姜再劑而愈。

○一小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷左腮至中酉時青中隱白手足時搐此肝經虛弱肺金所勝而潮搐脾土虛弱而手足冷也。用補中益氣湯以調補脾肺用六味地黃丸以滋補肝腎而愈。蓋病氣有餘當認爲元氣不足。若用瀉金伐肝清熱化痰則誤矣。

○一小兒慢驚睡多驚啼九面黃服細者難治用此藥與乳母服之。

釀乳法

木香

沉香

藿香

丁香減半

陳皮

人參

神麴炒

麥芽炒

右劉每服四錢。紫蘇十葉生薑十片。棗二枚。水煎先令乳母食後搗去宿乳汁服之。即便臥霎時令藥入乳之。豚次令兒吮不可過飽亦服法。五味異功散方見脾胃補中益氣湯方見脾胃六味地黃丸方見諸疳。

慢脾

慢脾之症面赤額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭禁口咬牙床手足微搐不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極續歸虛處惟脾所受故曰慢脾風若逐風則無風可逐癰驚則無驚可療但脾間痰涎壅滯而然耳世所謂慢驚難療者慢脾風是也宜服

加味四君子湯

人參一錢

白茯苓五分 蒼朮三分

炮乾姜四分 白朮炒六分

製附子一分 羌活三分 炙甘草四分

右劉生薑三片棗一枚水煎服

○一論慢驚慢脾症惡之症藥力不到者但看兩脚面中間陷處有太冲脉即灸百會穴三五壯如小麥大灸後仍與醒脾之劑調之

○論小兒慢脾風內虛昏迷不醒宜加味大醒脾散

人參

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

橘紅

丁香

木香

南星

炮

金錫

去毒炒

天麻

白附子

山藥

石蓮肉

去殼

石菖蒲

肉豆蔻

砂仁

甘草

右劉生薑三片。棗二枚。水煎服。回陽加附子。

○一論小兒驚風後聲啞不能言及諸病後不能言

天南星一箇。炮去皮。為末。每半字。五歲兒半錢。獾猪膽汁調食。前服。

○一論治慢驚慢脾之聖藥也。一錠即有起死回生之功。頃刻奏效。故名。

回生錠。真海上仙丹也。急驚亦効。

回生錠

人參 五錢

白朮

去蘆油

白茯苓

去皮

懷山藥

桔梗 各一兩

甘草 三錢

膽星 五錢

赤石脂

煅

五辰砂 三錢

乳香 二錢 另

蒙右三錢 煨金色牛黃一錢 麝香一錢

右為末五月五日午時取粽搗勻印作錠子金箔為衣陰乾每服三五分薄荷湯化下

諸疳

脉訣啓蒙曰小兒脉單細為疳勞○虎口紋白色白色者為疳

夫疳者甘肥無節乳哺不調或稟賦怯弱血氣不足蓋十五歲以前為疳已後為勞也書載五疳病關五臟要亦脾家有二臟有積失治而傳其餘也脾家病去餘臟皆已症雖分乎冷熱治當以補為先宜用地黃丸五疳膏肥兒丸之類

○一論小兒疳病面黃肌瘦肚大青筋木使色疳白小便渾濁或澄之如米泔此疳病也消疳湯

山查

白芍炒

黃連姜汁炒白茯苓

白朮去蘗

瀉瀉各一錢青皮四分

甘草生三分

右剉一剉薑棗煎服

○一治小兒疳積發熱肚大青筋骨瘦如柴消疳退熱飲

山查去子

烏藥

燈心

竹茹

檳榔尖

史君子去殼

燕夷仁

淮水通

黑牽牛

大黃

柴胡

莪朮煨

枳殼去穰

黃芩

甜葶藶

右剉水煎溫服

○一論肝膽經熱毒癰癤或耳內耳下生瘡發熱潮熱或肝經濕熱下注囊癰便毒腫潰或小腹脇股結核凡肝膽經部分一切瘡瘍瘰癧並用九味柴胡湯

柴胡

黃芩

分炒各五

人參

山梔

半夏

龍膽草

當歸

芍藥各三分甘草二分

水煎服

○一論小兒肝疳白膜遮睛肝經虛熱血燥或風客淫氣而肝火凝結核

或四肢發搐眼目抽動痰涎上壅凡傷損出血多抽搐發熱又治腎疝
腦熱消瘦手足如水寒熱往來滑泄肚脹口臭乾渴齒齦潰爛尿黑而
鯁遍身兩耳生瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失瘡或小
便淋閉咳嗽吐血或咽喉燥痛口舌瘡裂或稟腎不足肢體瘦弱解顛
鶴節五遲五軟或畏明下竄或早洩女色精血虧耗五臟齊損凡屬腎
肝諸虛不足之症皆宜用此以滋化源其功不能盡述

六味地黃丸

懷生地黃

酒浸砂鍋內燉至極黑拍碎入

山茱萸

酒蒸去核取肉

乾山藥

略

牡丹皮

去骨

白茯苓

去皮

澤瀉

去毛各三兩

右忌鐵器為細末和地黃膏加煉蜜為丸如梧子大每服三五十丸空

心白滾水下

○一治小兒五疳潮熱面黃肌瘦煩渴壯大青筋手足如柴精神困倦
試有效無疾預服此藥則諸疾不生也氣虛弱者服半月身體健壯

保嬰五疳膏

青皮麩炒二錢橘紅五錢

白朮去蘆蜜水炒一兩半

白茯苓七錢半

麥門冬去心史君子肉剉

炒七錢半

山查肉五錢麥芽炒五錢

金櫻子肉畧炒五錢

芡實仁二錢蓮肉心二錢甘草一錢半

右為細末和勻重七兩每次用藥末一兩煉蜜四兩調成膏每日中晚間各服一二茶匙溫水漱口○身熱咳嗽加地骨皮百部○肚腹飽

脹大使稀水腹鳴作聲或蟲出不知加檳榔二錢木香一錢○氣

弱加入參二錢半○一論消疳化積磨癥清熱伐肝補脾進食殺蟲潤肌膚養元氣真王道

肥兒丸

人參三錢半白朮去蘆

白茯苓去皮黃連錢半三胡黃連五錢

史君子去殼神麩炒

麥芽炒

山查肉錢半甘草錢半三錢

蘆薈二錢半碗底泥封固置坑中四面各插少燈透用

右為木黃米為餅白湯化下或作丸黍米大每服二三丸九見木

癖疾

夫癖塊者嬰兒飲食失調三焦關格以致停滯腸胃不得宣通初起為積久則氣血與痰熱積塞于腹脇及瘕家縱飲生冷漿水亦能成之其症作痛有時而黃肌瘦倦怠無力或生潮熱寒熱是也治先定去寒熱次用消堅故結和脾益胃之劑理之更用次去賊藥久之自効

○一論小兒腹中癖塊發熱增寒口乾小便赤或大便稀澹或腹脹腫滿或痰嗽喘熱不思飲食面黃肌瘦四肢困倦等症。

淨府湯

柴胡一錢 黃芩八分半 夏姜炒八分 人參三分 白朮去蘆炒八分
白茯苓去銀猪苓五分 澤瀉二錢 三稜煨七分 莪朮煨七分
山楂肉一錢 胡黃連三分 甘草三分

右劉下劑生薑三片棗二枚水煎服

○一論小兒癰積日久不消元氣虛弱脾胃虧損肌肉消削肝大青筋赤熱口乾肚腹脹滿。

抑肝扶脾散

人參五分

白木

土炒

煨苓八分

陳皮六分

青皮

香油炒

龍膽草

酒洗

白芥子

炒

柴胡三分

山查肉

八分

神麴

炒

六分

黃連

錢炒

胡黃連

三分

甘草

三分

右劉下劑生薑三片棗二枚水煎溫服

黃龍丸

扶溝劉小清傳

雄黃

一錢半

蜈蚣二條

砂鍋內炒去

麝香

三分

阿魏

三分

牛黃一分

天竺黃

三分

右爲末化黃蠟一兩爲丸如葶豆大先服七丸則熱退次服九丸則塊

消三服十一丸則病根除每用黃蠟煎雞子清入藥于內黃酒下

肥兒丸方見前

治瘰癧

○一專貼瘰癧氣塊身體發熱口内生疳此藥用狗皮攤貼患處每箇重七錢貼三日止熱七日覺腹微痛十日大便下膿血為驗大有神効忌生冷腥葷發物百日

神仙化癰膏

真香油四兩秦光五錢

三棱五錢

黃丹

色一片二兩水飛過炒紫

黃柏五錢

穿山甲片

四當歸三錢

莪朮五錢

全蝎十四箇

大黃三錢

蜈蚣五錢

木鱉子七箇

右將藥入油內煎黃色為度濾去渣搗爛待用油冷時下黃丹用文武火熬槐柳條不住手搗黑烟起滴水成珠手試軟硬方可離火次下五味細藥並入搗爛粗渣於內

真阿膠

一兩乳香五錢

沒藥五錢

麝香一錢

皮硝二錢風化

攪勻以磁器內盛之如用坐水內鑊開不可火上化如有馬刀櫃平資

加琥珀一兩在內無不効驗

○一將軍皂莢百勝膏 貼癰如神

大黃 白芷 各二兩三稜 我朮 各一兩木鱉子十箇

蜈蚣十條 穿山甲片五巴豆十箇 五車麻子十箇 五箇

黃連五錢 槐柳條三百寸

香油一斤入藥熬黑色去渣濾淨再加黃丹一斤熬滴水成珠再加血

竭五錢蘆薈五錢天竺黃五錢輕粉五錢阿魏五錢麝香五分胡黃連

二錢硼砂二錢為末下油為妙

○一治小兒癰疾發熱之甚及眼瞤方。

明目化癰丹

牛黃一分 片腦一分 熊膽一分 麝香三錢 乳香三錢

右共為細末先將乳汁於銅杓中炭火上滾黃色下前藥忌服出攪勻

於油車紙上丸如米粒大男左女右肝時點入大眼角內含眼自化頭

上出汗至胸前第二汗至臍上第三汗至臍下再點三汗腹滿下膿血即愈妙不可言

化癖金丹 內閣秘傳

蟾酥水泡

黃蠟各二錢 羚羊角

牛黃各五分 麝香三分

巴豆肉一錢 硃砂

冰片各一分

右為末丸如菜子大每用一粒用扁頭針在患處刺破皮入之用膏藥貼上丁伏時揭起其癖化膿血出盡服調理脾胃之藥而愈

○一論小兒患癖年深不愈諸醫以攻剋殺伐之劑屢投不愈以致元氣耗傷脾胃損傷血氣乾涸肢體羸瘦面色痿黃肚大青筋身熱自汗喘急氣促泄瀉腹脹浮腫不思飲食予以補中益氣湯久服而愈

熱證

小兒之病惟熱居多夫熱有虛有實實則面紅目赤氣喘口乾燥渴小便

赤泄。太便秘閉。五心煩熱。日夜焦啼。發壯熱。宜太連翹飲主之。虛則面
白眼。青氣微。口中清冷。恍惚神緩。太便秘。而小便頻。夜出盜汗。發虛熱。
宜惺惺散主之。其有身體乍冷乍熱。怫鬱驚惕。上盛下虛。此冷熱不調。
侯也。如熱在表。宜汗在裏。宜下。表裏俱熱。則宜解散。其或表裏已解。熱
又時來。此表裏俱虛。氣不歸元。而陽浮於外。不可用服涼藥。必使陽歛
於內。身體自涼。宜參苓白朮散主之。又有潮熱。則發熱有時。驚熱。顛叫
恍惚。夜熱多發。且止。餘熱寒邪未盡。食熱。肝腹先發。熱疳熱。骨蒸盜汗。
壯熱。一向不止。煩熱。心燥不安。積熱。煩赤口瘡。風熱。汗出身熱。虛熱。困
倦少力。客熱。來去不定。瘧熱。寒嗽。飲水寒熱。發如瘡狀。血熱。已午時發。
熱。瘧疹。熱耳鼻尖冷。十六者大同而小異。諸症得之。各有所歸。其間或
有三兩症交互者。宜隨其輕重而處治之。蓋小兒氣稟純陽。臟腑生熱。
陰陽氣變。薰蒸於外。致令身熱也。若肝熱。則兩眼赤痛流淚。羞明或生
翳障。心熱。則口内生瘡。小便赤腫淋瀝不通。肺熱。則鼻衄不止。太腑閉。

結脾熱則多涎沫。日內長流。心脾熱則生重舌。木舌。胃熱則作口臭。腎熱則耳聾。或出膿汁。此五臟所生。主熱各不同。是不可以舉論也。木抵熱則生風。風則慄矣。

○一論小兒心經邪熱。心與小腸受盛。乃水竇之處。常宜通利。壅則結滯。則脫。熱則溢。盛則淋。平涼心火。三焦自順。不待疾作而解。証成而療者。疎待有之矣。下十五味。加湯使用。總治邪熱。客熱。寒邪。風邪。胃之肺經。心將受之。不受。觸傳于小腸。或閉。或泄。或赤。或白。淋瀝不通。榮衛不通。壅之。作疾。其發多端。以致膈熱。眼目赤腫。唇白。白瘡。津液不生。涕唾稠盛。須在表裏俱得其宜。霍亂風悉能散之。痰熱亦自消除。連翹之功。可謂大連翹飲。

連翹

黃麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥

山梔子

木通

當歸

防風

黃芩

柴胡

甘草

荆芥穗

鮮薑

分錢

分錢

分錢

分錢

分錢

分錢

分錢

分錢

分錢

分錢

右劉作一劑竹葉十箇燈草十莖水煎服之風厥熱終痰熱加麥門冬
○實熱丹熱加大黃○胎熱瘡疹餘毒加薄荷葉○癰疽毒熱加黃
一論小兒頭熱熱毒唇口腫破生瘡牙齦出血口臭煩熱咽乾煩燥不
寧并瘡疹餘毒未解或頭面身體多生瘡癰宜

五福化毒丹

犀角身三錢桔梗一兩 生地黄酒浸赤茯苓去皮鼠粘子微炒各

粉草 林梢各三錢連翹 玄參各六錢青黛二錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸薄荷湯研化下兼有熱者
一論小兒驚風一症乃小兒蒸皮長骨變幻精神不須服藥其有驚風
風咳嗽痰涎鼻塞聲嘶變熱發熱宜服此方

惺惺散

人參 白朮去蘆 白茯苓去皮甘草炙 桔梗 白芍炒

天花粉 細辛 薄荷葉 右劉每服二錢水煎服

感冒

○論小兒感冒或冒寒。

用老葱三四根。春破爛以手抹來。相揉。滴乾。烘溫。暖向病者。通身擦之。通氣處。再偏擦幾遍。取效。出汗立愈。又不相妨。

出痘疹。屢驗絕妙。

○一治小兒面青身冷。默然不語。用熾火通身。手足按穴。爆之。立醒。

○論小兒傷寒頭痛。壯熱惡寒。咳嗽鼻壅。聲重。痘疹欲出。發熱驚風。嘔嗽。手足攣攣等症。宜服。

人參敗毒散

羌活

獨活

柴胡

前胡

枳殼

桔梗

白茯苓

川芎

薄荷葉

人參

甘草

右剉。姜葱煎服。

○論小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐搦初作

人參

羌活

獨活

前胡

川芎

桔梗

天麻各五錢薄荷

地骨皮各三錢甘草一錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸薑湯研化下

○一論小兒四時感冒傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰壅壅嗽及驚風潮搐驚毒中暑并瘡疹欲出發搐皆可服之壯實小兒三五日服一丸可免驚風痰嗽等疾宜

地龍丸

南星

為時入臘月黃牛胎中陰乾

天竺黃

雄黃

辰砂

研各四錢

麝香一錢

石為細末炙甘草膏為丸如皂角子大每服一丸薄荷湯研化下百餘內者作三服或用臘雪水養甘草膏汁和藥丸佳

按右方。若風熱痰嗽。或急驚發搐。昏睡咬牙。形病俱實。宜用此方。若初
見風寒咳嗽。痰盛氣喘。若屬客邪內作也。先用十一味參蘇飲。若邪既
解而腹脹吐瀉。或發搐咬牙。睡而露睛。為脾肺氣虛也。用四君子湯加
陳皮。名異功散。切忌祛痰表散。若過服而致前症者。尤宜溫補脾肺。
參蘇飲方見咳嗽。

脾胃

一論小兒諸病。因藥攻伐。元氣虛損。脾胃衰憊。惡寒發熱。肢體倦怠。飲
食少思。或兼飲食勞倦。頭痛身熱。煩燥作渴。脉洪大弦虛。或微細軟弱。
右關寸獨甚。亦宜用之。大凡久病。或過服攻伐之劑。損元氣而諸症
悉具者。最宜此湯調補。若無前症。致兒為患。者尤宜用之。

補中益氣湯

黃芪 蜜水炒 揀參 各八分 白朮 土炒 當歸身 酒洗 各一錢

陳皮

甘草分各五升麻

柴胡各二分

右剉薑棗煎空心溫服

○論小兒脾胃虛弱或因就伐之劑致飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實脾胃虛損吐瀉少食宜用

四君子湯

人參

白朮去蘆炒白茯苓去皮甘草各等分

右剉薑棗煎服

六君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或大便不調肢體消瘦面色萎黃

即四君子湯加陳皮半夏

○一論小兒脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足不寧或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有痰火兒患此者母亦當服之

異功散

人參

白茯苓 去皮白朮 去蘆炒甘草炙

一陳皮各等分

右劉美棗煎服。

傷食

經云脉滑者有宿食也。○虛口脉紋黃色為脾家有積。○小兒脉乳者為夫小兒傷食皆因乳哺不節過食生冷堅硬之物脾胃不能消化積滯中脘外為風寒所熱或因夜卧失蓋以致頭身熱面黃目胞微腫腹痛脇脹足冷肚熱喜睡神昏不想飲食或惡食或惡心或嘔或噎或口咬酸氣或大便敗卵臭或氣短痞悶或胃口作痛或心下痞滿按之則痛此皆為陳積所傷也宜以萬應丸利之若內停於食或外又感寒邪者則小迎氣口俱緊盛頭疼惡寒拘急兼前等症宜以太和散主之舊氏曰乳者奶也哺者食也乳後不可與食食後不可與乳緣小兒脾胃未弱乳食易傷難以消化初得成積久則成癖成疳變為百病可不慎乎

萬應丸方見雜治治傷食百病

○一論內傷乳食肚腹脹痛外感風寒頭疼發熱宜服

紫蘇

陳皮

香附

羌活

蒼朮

小荷

枳殼

山楂

神麴炒

麥芽炒

甘草

生薑三片水煎溫服

○一治小兒食積腹脹膨脹肚硬青筋 塔山王景明傳

黑丑炒生半檳榔各三錢木香五分

右為細末每服五分黑砂糖調入滾水服立消

○一論小兒時常傷食皮黃肌瘦肚大腹脹用此焦餅令常食之

消食餅

蓮肉去皮

山藥炒

白茯苓去皮芡實去殼炒

神曲炒

麥芽炒

扁豆炒

山楂去子

右各等分爲末每四兩入白麴一斤水同和烙焦餅用。

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定腹痛益元氣健脾胃。

啓脾丸

人參

白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 山藥 蓮肉 去皮各

山查肉

陳皮 澤瀉 甘草 炙各五錢

右爲末煉蜜爲丸如葶豆大每二十四粒空心米湯送下小兒常服消食諸疾服之立愈。

一論小兒傷食肚大腹脹。

用礞石小麴一收爲末打入雞子一箇攪勻入鹽少許蒸熟食之每早服一次可數次而愈。

一論健脾胃進飲食消積滯殺疳蟲長肌肉乃保嬰第一方也。

保嬰丸

臨川徐培鴻試驗

人參三錢 白朮 去蘆五錢 橘紅 剉淨五錢 白茯苓 去皮四錢 甘草 炙二錢

青皮錢

三錢

砂仁二錢

半

木香二錢

五分

山藥五錢

蓮肉錢

去皮

史君子

三錢

山查肉二錢

三奇

神麴炒三錢

右共為細末用生荷葉包陳米煮熟去荷葉將米研爛以淨布扭出再
煮成糊為丸如無仁大每二十五丸或三十五丸至五十丸陳米炒熟
煎湯不拘時服

○一小兒食積後嘔牙欲吐頃間腹脹昏憤鼻青黃赤此脾土傷而心肝

所動食積發厥也先令雞翎探吐出酸物頓醒節其飲食勿藥而愈

○一小兒好吃粉成腹脹痛用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

○一小兒因停食腹痛服峻利之藥後患瘧日晡而作此元氣下陷以補

中益氣湯合之

千金肥兒餅

小兒無病

日常食

三五餅

可防患

於未然

妙不可言

嬰孩恒關乳

飲食不消

停胃脾一傷損

吐瀉兩相能

痰嗽加喘喘

熱積致疳驚

面黃肌瘦削

腹脹肚青筋

卷之三 二

赤子焦啼	慈母苦傷情	吾心懷幼切	家蓮子茯苓
英寶乾山藥	扁豆薏苡仁	已上各四兩	神麴麥芽陳
人參史君子	山查國老并	六味每二兩	占糯米二升
藥米均為末	布裹甑內蒸	白糖二斤半	調和餅印成
每食二三餅	諸病即安寧	肥兒王道藥	價可擬千金

吐瀉

夫小兒吐瀉皆因氣未定。大產易侵熱以調護失常。乳食不節遂使脾胃虛弱。清濁相干。蘊作而然。大槩有冷有熱有食積三者之不同也。蓋冷者脾胃虛寒。水穀不化。小便白而大便青或如糟粕。手足厥冷或吐或瀉宜助胃膏去之。如上之症或兼有外感風寒內傷生冷身溫乍涼乍熱作吐瀉者宜藿香正氣散主之。熱者脾胃有濕大便黃而小便赤口乾煩渴四肢溫暖或吐或瀉宜甘露散主之。如上之候有兼中暑者

熱作吐瀉者宜如苓湯主之。或益元散亦可。食積者因傷食過多積滯
脾胃則吐脹發熱若吐如酸醜氣若瀉如敗卵其宜當倍九微利即愈
利後不愈乃脾胃虛弱仍以助胃膏主之。九吐瀉初起即服燒針九
固之即効。太抵吐瀉之症多因乳食過傷脾胃乳食愈飽則爲嘔吐乳
食傷脾則爲泄瀉吐瀉不止漸至日久深重其胃氣之虛而傷甚難治

吐瀉不治症

小兒瀉不定精神好者脾敗也。○吐瀉唇深紅者內熱故也不瀉必死。○
面黑氣喘者不治。○太渴不定止之又瀉腎敗也。○遺瀉不瀉者死。

燒針丸 治吐瀉如神

黃丹 水飛過朱砂

白礬 火煨各等分

右爲末。棗肉爲丸如黃豆大。每服三五丸。戴針尖上。放燈焰上燒過。在
性研爛。涼米泔水調服。瀉者食前吐者無時外用。棗豆粉以爲干散。和
作膏塗兩腳心。如瀉塗額門止則去之。

○一治脾胃虛弱吐瀉不食凡虛寒症先服此以正胃利氣
五味異功散

人參 白朮 去蘆 茯苓 去皮 陳皮 甘草炙

右劉散姜棗煎服。

○一論小兒吐瀉脾胃虛弱飲食不進腹脹滿腸鳴久瀉虛寒等症
助胃膏

人參 白朮 炒 白茯苓 去皮下香 木香

砂仁 白豆蔻 肉豆蔻 官桂 藿香

甘草各一錢 陳皮 四錢 山藥 四錢

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服下丸米湯化下兼治嘔乳便黃或
睡夜啼脫寒腹痛

○一論四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛胃風
吐瀉中濕身重泄瀉爲脾胃不和或飲食停滯復感外寒頭疼身重或嘔

逆惡心膈膈痞悶或發寒熱無汗

藿香正氣散

藿香一錢

紫蘇八分

陳皮

厚朴姜炒

半夏姜炒

白朮

去麩炒

白茯苓

去皮

桔梗

大腹皮

白芷

甘草炙各五分

劉下劑姜棗煎服

○一論小兒夏秋之月霍亂吐瀉身熱口渴

加減茹苓湯

猪苓七分

澤瀉七分

白朮

去麩五

赤茯苓

去一錢

黃連

五分

香茹七分

乾葛七分

天花粉

二錢

甘草

五分

右劉生薑煎服

○如熱極加石羔知母

○瀉極加升麻

○腹痛加炒白

芍

一錢

桂二分

寒濕亦加

○一論小兒五種泄瀉赤白痢疾宜用

鐵門全

文蛤

一兩炒白 二錢 牛生牛枯

黃丹 二錢

右為末用黃蠟一兩化開為丸如菽豆大每服大人十五丸小兒五七丸用茶下錢姜二錢煎湯下

○一小兒水瀉痢疾用蜜三匙枯礬末三錢蘿蔔汁調服出微汗忌醋○一論小兒脾胃虛嘔吐泄瀉頻不止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲水乳食不進瀉因未治變成慢驚風癰不問陰陽虛實並宜服之七味白朮散

人參

白朮

去蘆炒 白茯苓

去皮 藟香

木香

乾葛

甘草

右剉薑棗煎服○如小兒頻頻瀉利將成慢驚加山藥扁豆肉豆蔻各一錢姜汁一匕煎服○若慢驚已作加細辛天麻各一錢全蝎三箇白附子八分○若小兒冬月吐乳多是胃寒胃虛所致加丁香香二錢○若胃虛不能食而太渴不止者不可用淡滲之藥乃胃元氣少故也又白

水散補之。○如不能食而渴者，倍乾葛加天花粉。○如能食而渴者，倍黃連。○一論小兒嘔吐不止，宜

水香

半夏麴

南星湯泡三錢薑汁炒

丁香

陳皮各二錢砂仁

藿香各五錢

人參一錢半

右為細末，薑汁打糊和成錠，辰砂為衣，淡姜湯送下。

○一論小兒久瀉久痢不止，及滿口生瘡，白爛如泥，痛哭不已，諸醫罔效。

巴豆去殼

瓜子仁七箇

燒紙錢

一箇共搗，一處如泥，津調貼在兩

眉間正中，待成疤揭去，即愈。

○一論小兒泄瀉，用巴豆研末，為膏貼在額門上，燒線香，下此法

○一論小兒泄瀉不止，用山藥炒為末，不拘多少，入粥同煮食之，立止。

○一論小兒久瀉，兼脫肛，小腹重墜，四肢浮腫，面色痿黃，時或甚，內消者，藥到

口，即嘔吐，審乳母憂鬱傷脾，大便不實，先用補中益氣湯，後用五味異

功散及四神丸調治其母不兩月而子母俱痊。

○丁小兒傷食嘔吐服尅伐之藥嘔中見血用清熱涼血之藥又太便下血唇色白而或青問其故於余余曰此脾土虧損肝木所乘而然也令空心用補中益氣湯食遠用異功散以調補中氣使瘀血各歸其源而

○丁小兒吐瀉不止或取轉過多四肢發厥虛風不省人事用此即肢漸暖神識漸省。

回陽散

禾南星爲末每服三錢入京棗三枚同煎溫服。

○一治小兒吐瀉不定

五倍子二箇丁生丁熟甘草一搗用濕紙裹炮過同爲末每服半錢米

痢疾

天小兒八痢者乃飢飽勞役風寒暑濕因觸冒天地八風之邪而得故以

命者止人抵多由脾胃不和飲食過度停積於脾胃不能消化又為風寒暑濕干之故為此病傷寒則赤傷風則白傷風則純下清血傷濕則下如豆汁冷熱交并赤白兼下若下迫後重裏急窘迫急痛者太性急速而能燥物故也或夏末秋初忽有暴折於盛熱無所發散客熱肌膚之中發於外則為癰發於內則為痢內外俱發則為癰痢凡痢病久則令腫滿下焦偏冷上焦偏結則為上實下虛若脾胃濕熱之毒蒸蒸清道而上以致胃中閉塞而禁口之症又有丁方丁家之內上下傳染者幼相似是疫毒痢也當先推其歲運以平其外察其鬱結以調其內審其所傷別其虛實冷熱以治之條然明白不致妄投也

痢疾不治證

凡小兒下痢如豆腐色者死○下如屋漏水者死○下痢日久大孔如孔者死○下痢如竹筒注水者死○又小兒赤白同下久而不禁小便赤澀腹痛發熱唇紅舌胎氣促心煩坐卧不安狂渴飲水穀道頻陷時復

面赤似壯飲食全不進者並不治

清熱化滯湯

治痢主方

黃連

吳茱萸煎湯拌炒

白芍藥

陳皮

白茯苓去皮

枳殼

去殼炒黃芩

甘草

右制生薑下片水煎空心溫服○初起積熱正熾加大黃芒硝○血痢加酒炒黃芩當歸地榆○白痢加厚朴枳殼○赤白並下加川芎歸尾桃仁紅花滑石陳皮乾姜炒黑○白痢久虛加白朮黃芪茯苓去赤連枳殼○赤痢久虛下後未愈去芩連加川歸白芍白朮川芎阿膠珠○裏急後重加木香檳榔○腹痛加白芍川歸玄胡索枳殼○小便赤少加水通格令澤瀉○下如豆汁加白朮蒼朮防風○食積加山楂枳實麥芽神曲○久痢氣血兩虛加人參黃芪當歸川芎升麻肉蔻○下後二便流利惟後重不去者氣陷于下也以升麻提之

○一論小兒痢疾屬熱居多用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅

花白痢加滑石末同煎

關板丹

黃丹

飛過

二黃蠟一兩

乳香一錢

沒藥一錢

杏仁

去皮生

巴豆

去油八

右將四味為細末將黃蠟鑊開後將末藥同蠟拌勻攪令成丸如黃
瓦大每服一丸空心服紅痢令甘草湯下白痢冷乾薑湯下水瀉冷米
湯下忌生冷油膩

一治休息痢及癰瀉日久不能安

用鷄子一枚打破用黃蠟一塊如搗大銼內銼以雞子拌和炒熟食之

一治小兒痢疾方

用雞子一箇冷水下鍋煮二三沸取出去白用黃研碎以生薑汁半小

鍾和勻與兒服之不用茶神効

一治小兒患痢脰肚色赤或痛以補中益氣湯送香連疔而愈後復食

作瀉復脫肛不入仍以溫氣湯服更以草麻仁研末項間

○一治小兒久痢裏急後重欲去不去手足並冷皆胃氣虛寒下陷也以補中益氣湯加木香補骨脂倍加升麻柴胡

○一治紅痢及噤口

用田螺搗爛盒脐中項刺効

○一治痢不拘赤白

白蘿蔔汁蜜各等分攪勻服三四匙効

○一治小兒噤口痢用甜梨一箇穿入紙填滿紙包火煨熟吃立止

○一治噤口痢湯飲米穀不下者

石蓮子去殼并內紅皮及心為細末每服搗兒木小或五分或一錢二錢

錢用陳倉米湯調下如嘔加生姜汁一二匙

○一治血痢用苦參炒為末每服三分或五分米湯調下

○一治白痢用肉豆蔻麝香丁粒共為末每服二三分米湯調服

○一治久痢不止用陳蘿蔔煎湯下服立止○下方用葛菜煎湯服效
 ○一治瀉痢久不止不肯服藥用肉苁蓉煨去油獨赤干錢麥麴四兩同
 和切麴入葱搗煮如常食之

瘧疾

夫瘧者外因感受風寒暑濕內因飲食飢飽而作也其症不一先寒後熱
 者名寒瘧先熱後寒者名溫瘧寒而不熱者名牝瘧熱而不寒者名癘
 瘧不寒而熱骨節疼痛身重腹脹自汗善嘔者名濕瘧暖氣吞酸胸膈
 不利者名食瘧一日一發受病一月間日一發受病半年連發十日謂
 丁日者氣血俱病也起于三陽者多熱而發于日起于三陰者多寒而
 發于夜發于日者隨症而治發于夜者加無藥并用升提暫瘧可截久
 瘧加補經久不愈縱兒飲水結瘧中脫名曰瘧母此最難痊一二發開
 用截太早必變浮腫疔利之疾然嬰兒之瘧自飲食得之居多治須以

消導扶胃氣為本。此秘訣也

○一論食嘔嘔吐痰沫及時行癰瘡小兒先寒後熱諸瘡通用

清脾飲

青皮

厚朴 姜炒

草果

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

柴胡

黃芩

半夏 姜炒

甘草

右剉薑煎服。○小便赤加滑石澤瀉

○一論傷食感寒發瘧及中脘虛寒嘔逆惡心等症

養胃湯

蒼朮

米泔浸厚朴 姜汁炒 陳皮

半夏

姜炒

白茯苓

去皮

人參

草果

藿香

甘草

右剉烏梅下箇生薑水煎服

截瘧飲

白朮

去蘆

蒼朮

米泔浸陳皮

青皮

去穢

柴胡

黃芩

猪苓

澤瀉

常山

甘草

右判薑棗水煎露一宿溫服。

○有汗而熱多者加入參黃芪前胡知母

○無汗熱多者加乾薑紫蘇○寒多加乾姜草果○疹多加牛夏貝母

○食積加枳實山楂神曲麥芽○夜發者芍藥分加當歸止麻○二日

三日一發者加入參黃芪白朮烏梅去蒼朮○單寒加乾姜附子人參

去柴苓猪苓澤瀉○腹痛加厚朴枳實○室女熱入血室加小胡湯

截癰仙丹

五月五日午時用雄黑豆四十九箇先一日以水泡去皮研爛入水

五分同搗為丸如黃豆大雄黃一錢為衣陰乾收貯臨發日早黃面東

無根水下十九忌熱酒熱物一時仍忌魚腥生發之物三日黑豆圓是

○一乳見癰疾瘡塊

川芎

生芩

白芍藥各一陳皮

半夏

炒芩各一錢甘草

右作一服薑三片煎下釐甲未生錢

○一治是痰邪盛用天靈丹燒存性為末每服三錢溫酒調下立已

痰喘

痰者風之苗然生於心痰生於火火者痰之根靜則伏於脾土動則發於肺金水澄則清水沸則渾小兒痰嗽乃心火剋制肺金或寒邪停留肺膈寒化為熱必生痰喘咳逆上氣肺脹胸脇痞為馬脾風又為風痰若不速治立見危殆

奪命丹 治小兒風痰灌膈利痰去風

青蒙石煨為末煉蜜為丸如芫豆大每七八丸薄荷湯下

○一小兒風痰吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食

小兒肺脹喘嗽 多人看作風痰 大黃枳實二兩半 人參分兩等分

五味研成細末 蜜水調量稀稠 每將一字下咽喉 不用神針火灸

右其證肺脹喘逆胸高氣急而脇掣動陷下作坑兩鼻竅張圓亂喘渴

聲更不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死于旦夕也
定喘湯 治喘喘氣急

麻黃 六分

杏仁 三枚

桑白皮 六分

蘇子 四分

款冬花 六分

甘草 二分

白果 五枚

黃芩 微炒 三分

白果 五枚

白果 五枚

白果 五枚

右判水煎溫服不必用生薑

一論小兒脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心肚腹膨脹腰背倦痛虛勞冷嗽諸藥無効者服

人參款花膏

人參 八錢

紫苑 一兩

款冬花 八錢

桑白皮 五兩

貝母 二錢半

桔梗 二錢

紫蘇 五錢

檳榔 五錢

木香 五錢

杏仁 錢

五味子 八錢

馬兜鈴 二錢半

右為末煉蜜為丸如龍眼大每下一丸薑湯化服

一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

用豆一粒搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻痰即墜下

咳嗽

夫咳嗽者肺為嬌臟外主身之皮毛內為五臟華蓋形寒飲冷燥熱鬱蒸最為傷也而肺實肺虛皆能壅痰而發咳也咳嗽二症難作一途咳謂無痰有聲肺氣傷而不清嗽謂無聲有痰脾濕動而生痰咳嗽謂有聲有痰因傷肺氣兼動脾濕也其症感風寒者鼻寒聲重停寒者悽慘怯寒夾熱者則焦煩受濕者為纏滯停水者則怔忡若痰飲則咳有痰聲痰出咳止火極則咳聲不轉而赤痰結肺氣則喘滿氣急息重風痰壅盛則咳至極頻吐乳食與痰俱盡方得少息而或實或虛則視痰之黃白唾之稀稠而可知也以二歲論之春乃上升之氣夏乃火氣炎上秋由濕熱傷肺冬則風寒外束以一月論之清晨本曰痰火午後皆曰陰虛夜間或有食積其咳而吐膿血者肺熱感也冬痰不已必傷驚悸頑

涎甚至眼腫紫黑如物傷損血未征赤如血大可畏久治風寒山氣
散頑執宜清利受濕用勝濕之藥停水且濕水之劑痰飲即驚痰火候
則降火肺脹則養血味辛風痰壅盛宜苦甘而去風痰也况肺生胃門
更能溫中與表順助其氣滋潤肺經和順三焦一將見氣壯神清
胃復則痰不生肺滋則咳不有乳母忌食慎風寒咳何從而生乎
○一論春夏秋傷風咳嗽痰熱喘急非夾驚傷寒等症宜
雄朱九

牛膽南星

天花粉各

一薄荷

荆芥

防風

羌活

天麻

朱砂

雄黃各

六錢麝香三分

右為細末粳米飯

薄荷湯送下

○一論冬月感寒咳嗽夜不得睡以此益之
九寶飲

薄荷

紫蘇

大腹皮

麻黃

桂枝

桑白皮

杏仁

陳皮

甘草

右剉生薑三片烏梅一箇水煎溫服。

○一論小兒四時感冒發熱頭疼咳嗽喘急痰涎壅盛鼻塞聲重涕唾稠粘及肉傷外感一切發熱等症宜服。

參蘇飲

紫蘇

陳皮

桔梗

前胡

半夏

乾葛

白茯苓

去皮枳殼去穢

人參

木香

甘草

右剉生薑煎服。

○一論小兒咳嗽吐痰。

用甜梨一箇空小孔入罌砂一分燒熟與服或搗汁亦可。

○一論小兒一切咳嗽不已用。

寧嗽膏

麻黃

杏仁

去皮尖桔梗去蘆

甘草

知母

貝母

款冬花

黃芩

紫苑各五錢黃連四錢

香附

二錢

炒

牛膽南星

一兩

右為細末煉蜜為丸如芡實大每下丸白湯食後化下

○一論小兒身熱感冒鼻流清涕或鼻塞咳嗽吐痰輕者不藥候一二日自愈重者服此方治痰為主輕輕和解之

白朮

去蘆一錢

白茯苓

去皮七分

桑白皮

蜜炙七分

川芎

五分

桔梗

五分

橘紅

五分

半夏

泡五分

防風

四分

甘草

三分

薄荷

二分

枯芩

炒三分

右剉下劑生薑水煎服

○一治小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑如喘促出汗此脾肺氣虛以補中益氣湯加五味子

發沙

小兒發沙有陰有陽陰沙則腹痛而手足冷陽沙則腹痛而手足溫或其

症似寒非寒。似熱非熱。四肢厥息。飲食不思。容顏慘起。為症不一。俗呼為沙病。非沙也多。由感冒風寒。而頭水傷濕得之。其治之法。宜用熱水。蘸搭臂膊。將背麻頻頻刮之。候紅色出。為度。甚者宜以針刺其十指背。近爪處。一分許。仍先將兒兩手。自臂肘下。令血聚指頭。方刺。或視其身背有紅點。以燈草蘸香油。點燈燎之。已上諸法。使腰理開通。寒邪易散。氣血通暢而已矣。

○一論小兒攪腸沙。心腹腰諸痛。用

火龍丹。

雄黃

焰硝各二錢

共研細末。每用簪挑些點眼角。太背男左女右立愈。

通治

神像萬億九

朱砂

巴豆去殼

寒食麵

右先將朱砂研爛，即將巴豆同研極細，却以寒食麵、好酒打成糕，入藥中仍同研百餘下，再揉和為丸，如黍米大，凡所服不過三五丸而已。看虛實，加減，照後引下。

一感冒風寒，薑蔥湯下，出汗。

一心痛，艾葉煎湯，入醋少許，送下。

一心膨氣脹，淡薑湯送下。

一痢疾，空心茶清送下。

一瘧疾，薑湯下。

一切雜病，茶清下。

太乙混元丹

紫河車焙乾二錢

白梅花三錢

滑石六兩用杜丹皮二兩煎水去

辰砂丁兩甘草一兩水煮

香附米一兩蜜水煮透

粉草

生半兩

甘松

四錢

莪朮

炒三錢

砂仁

去殼六錢

山藥

姜汁炒二錢

人參

去蘆一錢

黃芪

蜜水炒一錢

白茯苓

去皮二錢

白茯苓神二錢半

遠志

甘草水一錢

泡去心

桔梗

去蘆一錢

木香

一錢

麝香

三分

牛黃

三分

天竺黃

一錢

丁方

無混元衣梅花

右共為細末，煉蜜為丸，如龍眼大，金箔為衣，每服量兒大小加減，大人婦女諸病並皆治之。

一中風痰厥不省人事，薑湯研下。

一傷寒來驚發熱，葛根湯研下，宜出汗。

一停食嘔吐腹脹，大便秘臭，姜湯下。

一霍亂紫蘇木瓜湯下。

一泄瀉米湯下。

一赤白痢疾，陳倉米湯下。

一咳嗽喘急，麻黃杏仁湯下。

一積聚腹痛，薑湯下。

一蟲痛苦練根湯下。

一疝氣偏墜，大小茴香湯下。

一夜啼不止，薑黃湯下。

一急驚搐搦，薄荷湯下。

一慢驚人參白朮湯下。

一大便去血槐花陳倉米湯下。

一小便不通車前子湯下。

一夜出盜汗浮小麥湯下。

一發熱金錢薄荷湯下。

一痘疹不出升麻湯下。

一中暑煩渴燈心湯下。

一疳熱身瘦肚大手足細或淋或瀉或腫或脹或喘或嗽陳倉米湯下。

一論小兒諸病有餘壯盛者宜服萬應丸小兒諸病不足虛弱者宜服

雄黃解毒丸

雄黃 二錢半 鱗金 二錢半 巴豆 二十四箇去油

右為末醋煮糊為丸如菉豆大每服七丸熱茶清吞下。

一中風卒然倒仆牙關緊急角弓反張不省人事茶清送下吐後立甦未

一小兒急驚風痰熱等症加牛黃五分礞砂一錢水糊丸薄荷湯下。

一纏喉風急喉閉每七丸研化以熱水研白梅花調下或熱茶下即甦熱

則流通之意纏喉風卒死心頭猶溫者灌下即甦。

一瘡疾中有毒用沉香磨水送下泄下黑血如泥極真立効

一諸積下痢魚五苓散送下

一疔瘡加全蝎下錢皂角下錢麝香少許滴水丸每服二十九茶下若始不覺是疔瘡不曾發汗過數日方覺則寒熱體痛皆罷毒氣入裏須用利藥使肉中毒氣下泄此藥主之

一瘰癧瘡加斑猫七箇去翅足糯米炒冷茶下

一切熱毒瘰癧盛又能取積消食下熱茶下

小兒初生

小兒五宜

一小兒分娩初離母體口有穢垢啼聲未發急用軟綿裹指拭去口中惡汁倘或不及預煎甘草黃連濃汁灌之待吐出惡沫方與乳吃或用朱砂水飛過煉白蜜調和成膏如小豆大乳汁化服三日內止進三粒

以除胎毒痘疹之患也

一初生三五日宜紉縛令臥勿豎頭抱出免致驚癇

一乳與食不宜一時混吃兒生疳癖痞積

一兒衣宜用年老人舊裙舊襖改作小兒衣衫令兒有壽雖富貴之家切不可製紵絲綾羅縐絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福

一兒生四五箇月止與乳吃六箇月以後方與稀粥哺之周歲以前切不可吃葷腥菜生冷之物令兒多痰苦待一二歲後臟腑稍壯方與葷腥庶可若到五歲後食之尤嘉一云小兒永無雜疾大忌雞肉絕妙

洗兒法

一初生兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍癰等症浴兒調和湯水須看冷熱得宜不可久浴久浴則傷風寒夏不可久浴久浴則傷熱浴時當護兒背免風邪而入不使發熱成癰疾用五根湯洗以免瘡疥之患

五根湯

桃根

柳根

梅根

桑根

槐根

加苦參

白芷同煎辟諸不祥

右每味二兩洗淨切碎用水煮去渣加猪膽汁一校候水溫洗投金銀銅器則辟諸惡邪之氣

斷臍法

一 小兒初生洗訖斷臍不可用刀割以軟絹裹臍或隔單衣咬斷蓋臍不可令長又不可太短只取兒足掌長如長引外風則成臍風之患短則傷臍內痛面青啼叫臍帶中有穢蟲宜急撥去不然入腹成疾

變蒸論

夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全有變蒸之候變者異常也蒸者發熱也所以變換五臟蒸養六腑頭面變蒸多遍則

節臟腑由是而全胎毒亦因變而散氣血方榮性情有異後來出痘不輕可也。自生之日始至三百日一變凡人有三百六十五骨除手足骨十五碎骨外正有三百二十骨。自生下骨而止。下日十骨。三十二日爲一變。腎氣始全。一變生一臟。或一腑。十變則臟腑始足。每變輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五日解重則八日解。凡小兒之病無不由變熱而得也。而不熱不驚無他病候是暗變者多矣。此受胎氣壯故也。凡變熱須看兒唇白如土唇微腫有如卧蚕或有珠子者是其變熱之候也。此則決不可妄投針灸藥餌。若誤之則爲藥引入各經證遂難識而且纏綿不脫反爲藥之所害也。或因傷食因傷風因驚嚇等項來雜相值而發令人疑惑亦須守候二三日俟其病勢其的是食則消食是風則行痰是驚則安神隨症調治。或非變熱時而得傷寒時行瘟病則只上無白泡其診皆相似惟耳及尻通熱此爲他病可作餘治。藥餌料者不可不詳究耶。

小兒初生雜證論方

夫小兒初出腹，骨氣未斂，肌肉未成，猶尚是血。血凝則堅，而成肌肉也。又云：如水上之泡，草頭之露。夫初生一臘之內，天地八風之邪，豈能遽害？良由在胎之時，母失愛護，或勞動氣血相干，或坐卧飢飽相役，飲酒食肉，冷熱相制，恐怖驚撲，血脉相亂，紐毒于內，損傷胎元，而降生之後，故有胎熱、胎寒、胎肥、胎怯、胎驚、胎黃諸症生焉。外因浴洗拭口，斷臍炎爛之不得法，或紉抱驚恐，乳哺寒溫之乖其宜，致令噤口、臍風、鎖肚、不乳等症病而致此，亦難治療。良可哀憫。小兒雜病諸方，悉陳于後。

胎熱	胎寒	胎肥	胎怯	胎黃	胎驚	鎖肚	不乳	臍風
撮口	噤風	客忤	不尿	夜啼	中惡	天弓	驚口	口瘡
重舌	木舌	弄舌	牙疳	吃泥	丹毒	赤遊	喉痺	乳蛾
眼疾	耳膿	鼻瘡	頭瘡	臍瘡	蟲痛	尾痛	陰腫	疳氣

痘瘡	疥疹	盤腸	氣痛	脫肛	遺尿	尿濁	便血	下淋	吐血	衄血
小便閉	大便閉	水腫	黃疽	汗症	解顛	鶴節	行遲	諸遲		
語遲	齒遲	龜胸	龜背	滯顛	顛陷	顛填	手拳	脚拳		

胎熱

○一論胎熱因母孕時食熱毒之物過多令兒生下身熱面赤眼閉口中氣熱焦啼燥渴或大小便不通法當漸次解熱先令乳母服藥兒服乳即解決不可速効以涼藥攻之必致嘔吐而成大患也慎之慎之

乳方

生地黄 二錢 澤瀉 二錢 半 猪苓 去黑皮 赤茯苓 去皮 天花粉 各一錢
茵陳 甘草 各一錢

右剉散每服三錢水一盞煎七分令乳母捏去宿乳却服藥少頃乳之

胎寒

○一論胎寒。乳母孕時受寒生下。再感外邪。令兒面色青白。四肢厥冷。太便青黑。口冷腹痛。身起寒慄等症。即宜當歸散服之。

當歸散

當歸炒

黃芪蜜炙

桂心

黃芩

細辛

龍骨細研

赤芍各二錢

右為末。每服一字。以乳汁調下。日進三服。仍看兒大小加減。

胎肥

○一論胎肥。小兒生下。肥肉厚。遍身血色紅滿。月以後漸漸羸瘦。目白睛粉紅色。五心煩熱。太便難。時時生涎。當浴體更別。父母肥瘦。肥不可生。瘦瘦不可生。肥。

胎怯

○一論胎怯。小兒面無精光。肌肉薄弱。太便白水。身無血色。時時哽氣。噓且無精彩。宜以浴體法主之。

浴體法

天麻末二錢。蝎稍去毒。

朱砂各半錢。白礬。

青黛各二錢。

烏蛇肉三錢酒浸焙。

麝香一字。

右同研勻。每用三錢水三碗。桃枝下握。并葉五七箇同煎。去滓溫熱浴之。浴時勿浴背。

胎黃

○一論胎黃者。皆因乳母受熱而傳於胎也。兒生下遍體面目皆黃。狀如黃金。色身上壯熱。太便不通。小便如梔子汁。乳食不思。啼哭不止。宜以

地黃湯主之

生地黃

赤芍

川芎

當歸

天花粉

猪苓

澤瀉

赤茯苓

茵陳

甘草各等分

右剉每服五錢水煎食前乳母服并略滴些少與兒口中

胎驚

○一論胎驚者由胎婦調適乖常飲食嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內溫壯昏眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐搦驚啼腮縮頭開或頰赤或面青眼合其有著噤撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若黯青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治反出外者不治治宜解散風邪利驚化痰順氣青金丸主之慎不可作慢驚也

青金丸

人參

天麻煨

白茯苓去皮 白附子炮

牛膽南星各二錢

甘草炙 一錢 青黛 一錢

朱砂水飛半錢 麝香 一字

右為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。用釣藤皂莢子煎湯研化。不拘時服。

鎖肚

一論鎖肚者。由胎中受熱毒。壅盛結於肝門。大小便閉而不通。腹脹欲絕者。急令婦人以溫水先漱了口。吸吮兒前後心并臍下手足心共七處。每一處凡三五次。漱口吸吮。取紅赤為度。須臾自通。不爾無生。有此症。知此法。可得再生。

不乳

一論不乳者。謂初出胎胎而不吮乳也。嬰兒初出胎時。其聲未發。急以手拭其口。令惡血淨盡。不得下咽。即無他病。若拭口不全。惡穢入腹。則

言十卷之三
令腹滿氣短不能吮乳或產母取冷過度胎中受寒致令兒腹滿吐乳
茯苓丸

赤茯苓 去皮川黃連 去毛枳殼 去穰炙炒各等分
右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服一丸乳汁化下

撮口

○一論撮口者由胎氣挾熱風邪入臍流毒心脾之經故令舌強唇青聚
口啼聲不出者當視其齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青
熟綿布裹手指輕輕擦破卽開口便安甚者用牛黃二分竹瀝一錢散
調勻滴入口中卽愈

噤風

○一論噤風者眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐

白沫大小便皆通。自滿月一百二十日見此名曰犯風。噤可急看兒上
膊有點子先以指甲輕輕刮破次服定命散如口噤不開諸藥不効者
生南星去皮臍研為極細末龍腦少許和勻指蘸生薑汁於大牙齒上
擦之立開凡臍風撮口噤風三者雖異其受病之原則一也太抵裏氣
鬱結壅閉不通並宜服淡豆豉汁與吃取下胎毒千金云小兒初生其
氣高盛若有微患即須下之若不下時則成太疾難為療矣紫雲丸
定命散 治初生小兒口噤不開

蟬退

十四箇

去毒

去毒

右為細末

入輕粉少許和勻乳汁調服

臍風

一論臍風多因斷臍為風濕所乘或者胎元有熱毒則見下胎時其
臍必硬直定有臍風必自臍發出青一道行至肚却生兩筋行至心者
必死於青筋初發急用燈心蘸香油內於青筋頭并各行畫處燻之

以截住不致致心更以外灸中脘三壯內服萬應丸二十粒以泄其毒

○一治小兒疳風撮口用完全生葱搗汁用直姜蚕三箇研末調塗母乳頭上令兒吮之或用乳調蚕末灌之兒口即開

一治疳風撮口用田螺搗爛入麝香一分再搗塗臍上立効
經驗五通膏 治小兒疳風撮口

生地黃

生薑

葱白

蘿蔔子

田螺肉各等分

右共搗爛拾臍四圍一指厚抱住候一時許有屁下泄而愈

○一治疳風用蟪蟪一條將尾鬚二根剪斷自然出水滴入臍內少頃即愈其蟲只在多年墻孔內取人家水缸底亦有

一秘方治疳風撮口

姜蚕末三分牛黃六釐水片 麝香各一釐先將姜蚕牛黃搽上次將

片麝用蝦蟇膽調抹之

一小兒犯撮口風荷包風驚口風疳風等項并牙齦邊生白點各為疳疳

作痛啼哭不吮乳即有口內堅硬之狀或牙齦腫痛白點狀針挑破出血
用如聖調薄荷湯以手指攪過再用其母油髮蘸墨逼口擦之仍用
絹蘸新井水展口即愈

客忤

○一論客忤者初生兒因別房基戶外人來氣息忤之。一名中人是為客
忤也及家人或乘馬行得馬汗氣息或衣染穢暴之氣未盥洗易衣便
向兒邊皆令忤也。小兒衣布帛中不得有頭髮穢中亦謂曰衣穢常
衣白帶皆令中忤亦能驚兒致病欲防之法從外來所忌之物常將避
之勿令兒見慎護三歲之內方無忌也

不尿

○一論小兒初生不尿者有因在胎之時母食糟麪炙等熱之物熱氣流

入胎出兒因飲血是以生下肚腹膨脹腎腫如蠶腸四傍有青黑色及
口撮即不可救也如有青黑色不飲乳者服葱乳湯
葱白切作四散用乳汁半小盞同煎片時分作四次服即服之即飲者

夜啼

○一論小兒夜啼者此是邪熱乘心也宜

花火膏 用燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吮之

○一治小兒觸犯禁忌而夜啼者宜醋炭薰服蘇合香丸

○一方用火柴頭一箇長四五寸削平一面朱砂寫云撥火杖撥火杖差
來提神將捉着夜啼鬼打殺不要放急急如律令

○又方治夜啼不止用朱砂書甲寅二字貼床頭即止

○一治小兒夜啼用竹園內無葉之竹名爲仙人杖取三尺放兒睡處勿
使入知即時愈

○一治小兒夜啼不止，任心經有熱，有虛火。

安神散 人參 黃連姜汁炒各錢半 甘草五分 右剉竹葉二十片，生薑二

片，水煎服。○一方治驚啼，用亂二錢 燒灰酒調服。

○一論小兒夜啼狀若鬼祟。

蟬退七箇半，截為末，初生抄丁字薄荷湯入酒，少許調下。或者不信，將上半截為末，依前湯調下，復啼如初，古人立法，莫知其妙。

○一治夜啼，用朱砂筆寫在小兒臍上。子勝卯酉 午

○一治夜啼，用尿潌杓水洗淨，莫令人知，覆在兒床下即止。

中惡

○一論中惡，天男者，冒犯邪氣也。小兒卒中，惡毒心腹刺痛，悶亂欲死。

辟邪膏 治中惡

降真香

白膠香

沉香

虎頭骨

鬼臼

龍膽草

人參

白茯苓

去皮各五錢

右為細末入雄黃五錢麝香一錢煉蜜為丸乳香湯下

天弔

○一治小兒天弔潮熱

鈎藤散

鈎藤

人參

犀角

鎊屑各五錢全蝎

天麻各二錢半

甘草炙一錢半

右剉作四劑水煎溫服

鵝口

○一論小兒鵝口口瘡者胃中濕熱也小兒口中百病鵝口口瘡重膠不能吮乳及咽喉腫塞一切熱毒

牛黃散

牛黃

冰片

硼砂

辰砂

研各

雄黃

青黛各二分牙硝一分半黃連末八分黃柏末八分

右共入乳鉢內研勻每用少許傳入口內

○一治小兒熱口不能食乳用地龍搗水塗瘡即愈即腐蟲也

口瘡

○一治口瘡

瀉心湯 用川黃連淨為細末每服下字蜜水調下

○一論小兒口舌生瘡乃心脾受熱口瘡赤心脾熱口瘡白脾臟冷口瘡

黃脾臟熱宜用

吳茱萸末醋調傳脚心移夜即愈藥性雖熱能引熱下行其功至良

○一論治小兒滿口白爛生瘡口糜

白朮 猪苓 澤瀉 木通 生地 赤苓 肉桂 甘草各等分水

○一論小兒白口瘡 黃丹巴豆仁同炒焦去豆用丹搽瘡上立已

咽喉并口瘡 我也有妙方 白礬二錢許 硃砂一錢強

咽痛用吹入 口瘡蜜調當 一次若不愈 再用骨安康

重舌

○一論重舌者脾經實火也小兒心脾有熱重下有形如舌而小者名曰

重舌及唇山兩傍生瘡

當歸連翹湯 治重舌

歸尾 連翹 白芷 鎔三大黃煨甘草各一錢右剉作二劑水煎食後頻

○一方治重舌用蒲黃塗之○一方用膽礬研細敷之

○一治小兒重舌木舌乃舌下生舌也

用三棱針於舌下紫脉刺之即愈又宜竹瀝調蒲黃末敷之舌上

○一治小兒絆舌用布針舌下針數下以唐雞屎一搭即愈

○一治小兒絆舌不乳啼哭用布針鰓相肉燒紅針下頰換骨邊一驗

木舌

○一論木舌乃舌腫硬不柔和脾經有實火也

瀉黃散 治木舌弄舌

藿香葉七分 山梔一錢 軟石膏五分 防風四分 甘草七分半

右剉下劑水煎不拘時服

○一治木舌 百草霜 芒硝 滑石 爲末酒調傳之

弄舌

○一論小兒舌微露而即收名弄舌屬心脾虧損用補脾散補之舌舒長而收緩名吐舌乃心脾積熱少用前瀉黃散去之燕口舌生瘡作渴飲

胃經實熱用瀉黃散作渴畏冷屬胃經虛熱用四君子湯食少作渴或
太便不實脾胃虛弱也用吐瀉門七味白朮散若午後甚名脾血虛也
四物湯多加參朮茯苓未應用內傷門補中益氣湯太病未已而者
弄舌微微露即收得於病後最難瘳出長收緩名舒舌

補脾散 治弄舌

人參

白朮

去蘊各一錢

白芍 酒炒

白茯苓

各八分 陳皮

川芎 各六分 黃芪

蜜炙

當歸 酒洗

甘草

各四分

右剉每劑三錢生薑煎服

牙疳

○一論牙疳者陽明之熱也小兒齒腫流涎腮腫走馬牙疳等症

清胃升麻湯

升麻

川芎

白芍

生薑 湯洗各一錢

防風 去蘆

黃連 酒炒

生甘草 焙五軟石膏 煨一錢

白朮 七分

白芷 三分

右劉水煎熱服能漱即含漱而吐之漱藥不用白朮半夏

○一治小兒走馬牙疳下時腐爛即死用婦人溺桶白垢火煨下錢許入

銅錄三分煨香下分半敷之立效

立効散 治走馬牙疳

青黛

黃柏

枯礬

五倍子 各一錢

右為細末用米泔水先漱口內擦入患處

○一論小兒走馬牙疳牙齦其爛像餅管口先用甘草湯洗皮肉出血

乏亦理身上肥瘠但是瘡瘡用之立効

玉蟾散

蛇皮即蝦蟇不鳴不鳴者是而黃泥裏火煨焦三錢生黃連一錢生黃

無一錢得香少許石為細末濕則乾擦乾則香油調抹之

吃泥土

○一論小兒愛吃泥土乃脾虛胃熱所致面色青黃或是不動此證治法若不急療源癖症生焉

清胃養脾湯

軟石膏

黃芩

陳皮

白朮去蘆

白茯苓去皮

甘草

胡黃連

使君子去殼

右剉等分水煎溫服或為細末放于飲食內令兒服之

黃金餅 治好吃泥土

熟艾土為末濃煎黃連汁和為餅服之立愈

丹毒

○一論小兒丹毒赤腫風熱狂燥睡卧不安胸膈滿悶咽喉腫痛九道血妄行遍身丹毒及痘瘡已出未出不能快透或已出熱不解急宜服犀角消毒飲

牛旁子微燒荊芥穗

防風

黃芩各一錢犀角鎊

甘草各五分右剉水煎不拘時服如無犀角以升麻代之

泥金膏治丹毒赤遊風

陰地上蚯蚓糞熟皮硝蚯蚓糞三分之二共一處研細新汲水濃調厚敷患處乾則再上

喉痺

○一論小兒喉痺會厭兩傍腫者為雙乳蛾易治下傍腫者為單乳蛾難治乳蛾差小者為喉痺熱結於咽喉且麻且痒腫遠於外名經喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉風宜按方

樊沔

主方

桔梗二錢
升麻三分
山豆根一錢
防風八分
生甘草一錢
荆芥穗八分
玄參八分
竹葉五箇

水煎頻服外用硼砂下味喻化燕平隆痰消腫

○碧雲
碧雲具足

硼砂與硝盆過黃甘草末俱生等分搽咽

喉痛咽喉腫痛水漿不下或生瘡裏舌水腫

○一治喉乳蛾氣絕者卽時返活

單乳蛾用皂豆一粒去殼打碎入綿團殼內塞鼻在左塞左在右塞右若雙乳蛾用二十粒塞兩鼻

○一喉蛾乳蛾風口舌生瘡用黑牛膽一箇入生白礬末二兩銀朱五錢入膽內陰乾取出研末每少許吹入喉內神效。

眼疾

○論小兒兩眼腫痛。上焦火盛也。

吹鼻散 暴發赤痛

乳香

沒藥各五分 雄黃三分

火焰一兩

黃丹水飛一分

右爲細末。每少許吹兩鼻孔。

○一論小兒未周患兩眼腫痛。

拔毒膏

用黃連爲末。水調敷脚心。手心自愈。如腫痛難開。加姜黃牙皂。

朴硝爲末。同敷太陽穴。手心足心。加葱搗爛敷之尤妙。

○一方熟地黃一兩。以新汲水浸透。搗爛貼兩脚心。布裹住効。

○一治小兒雀目。不計時月。

蒼朮二兩爲末。每服一錢。不計時候。以好羊子肝一箇。以竹力子批開。搽藥在內。麻繩扎定。以粟米泔一大盞煮熟爲度。患人先熏眼。溫服。

耳疾

○一論小兒耳腫耳痛停耳乃三陽風熱雍遏所致宜升陽散火湯加黃柏知母晚服兼服金花丸

○一論小兒耳熱出汁作痒乃痰也腎火上炎也宜用

清腎湯

防風

天花粉

貝母

黃柏 薑水炒 白茯苓

玄參

白芷

蔓荊子

天麻

半夏 湯洗各五

生甘草二分半

生薑三片水煎服

○一治小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓糞合豬脂敷之

○一治小兒患潰耳出膿水成瘡以蚯蚓糞末吹耳中

○又方治膿耳

羽澤散

枯礬為末少許吹入耳中即已

○一方用五倍子燒存性為末吹入耳亦效

○一方用初出雞卵殼炒黃色為細末香油調灌耳內即時痛止

鼻瘡

○一論小兒鼻瘡熱壅傷脾肺主氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮上入於血脉故鼻下兩傍瘡濕痒爛是名鼻瘡其瘡不痛汁所流處又成瘡

澤瀉散 治鼻瘡

澤瀉

鬱金

山梔仁

甘草炙各一錢

右為細末用甘草煎湯調食後臨臥服

○一治父患鼻瘡膿極臭者用百草霜研細每服五分冷水調服

頭瘡

○一論小兒頭生肥瘡或父生虱子搔痒成瘡膿水出不止

一掃光

細茶一錢口嚼爛水銀研入茶內牙皂 花椒銛二爲末香油調服

○一小兒頭瘡經年不瘥者

白礬五錢 胡粉一兩 水銀一兩 黃連一兩半 黃芩一兩

大黃一兩半 苦參一兩半 松脂一兩半 蛇床子十八硃

右爲細末以臘月猪脂和研水銀不時敷之

○一小兒頭瘡胎毒諸風熱惡瘡痘瘡

黃柏 黃連 白芷 五倍子各等分

右爲細末用井花水調稀稠得所塗開在碗內覆架兩磚上中火處灼艾煙薰蒸以黑乾爲度仍取下煎藥再研作末清油調塗如有惡則用

煎油調塗立効

○一小兒頭生禿瘡用通聖散酒拌除太黃另用酒炒共爲末再以酒拌煆乾每服一錢水調服外以白灰燒紅淬入水中乘熱洗之更以煎艾

子。依龍肝。懸龍尾。黃連。白朮。為末。油調敷之。

臍瘡

○一論小兒因剪臍外傷於風邪。以致臍瘡不乾。用礬龍散。

枯礬

龍骨煨各五分 共為細末。每用少許。乾摻臍上。

○一小兒臍中汁出。疔痛。用枯礬末乾敷。○又方黃柏末敷之。○又方礬頭殼燒灰存性。摻之亦可。

虫蝨積

○一論小兒蟲積痛。凡腹疼。口中出清水者。蟲積也。追蟲散。

使君子二錢 檳榔一錢 作三劑水煎食遠服。

使君散

使君子 去殼一錢

檳榔 一錢

雄黃 五分

右為末每服一錢苦練根皮煎湯調下

○一治小兒蟲積腹痛用巴豆丁枚去殼槌去油以朱砂丁粒同研勻用雞子一箇開頂微去白入藥在內攪勻仍將紙糊口用稭圈坐在鍋內水煮熟令兒食之或以茶清送下即打下所積蟲効極捷

○一治小兒吐蛇蟲

蛇蟲出口有三般

日鼻中來大不堪

如或自蟲兼黑色

靈丹縱服病難安

練陳湯

苦練根皮 二錢

陳皮

半夏 姜炒

白茯苓 錢 皮各一

甘草 五分

右剉丁劑生薑煎服

○一治小兒肚大腹脹蟲積瘦弱用馬慈丁名地黃食之打下虫來肚腹立

○一治小兒冬月吐酸，多是胃寒，胃虛所致。

錢氏白朮散

人參

白朮去蘆

白茯苓去皮

藿香

木香

乾葛

甘草各二錢，丁香二粒

每服三錢，水煎服。

尾骨痛

○一論小兒尾骨痛者，乃是陰虛痰火所致也。

滋陰化痰湯

當歸酒炒

川芎

白芍酒炒

熟地黃

黃柏酒炒

知母酒炒

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮

甘草各等分

右剉少，用官桂為引，或以前胡、木香為引，如痛不止，加乳香、沒藥。

陰腫疝氣

○一論小兒陰腫疝氣者寒邪所鬱也。五倍子燒存性為末，好酒調服。

○一治疝氣偏墜腫痛不可忍者，槐子炒為末，每服一錢，入鹽調下，立止。

○一治小兒疝氣小腹痛引腰脊，彎曲身不能直，京師傳。

青皮

陳皮

三棱

莪朮炮

木香

檳榔

川練肉

芫花

五錢 各梓桂

牽牛

生取木各三錢

巴豆肉 不去油一錢

右為細末，麵糊為丸，如麻子大，每三九空心下服。午前下服，薑湯下。

○一治小兒陰囊忽腫，或坐臥多時，或風邪，或蟲蟻咬者。

蟬退半兩水一大碗煎湯洗腫處，其痛立止。若不消，再煎再洗，內服。

五苓散燈草煎服，方見中暑。

○又方用葱園內蚯蚓糞，以甘草汁調塗腫處，或薄荷汁調亦可。

盤腸氣

○一論小兒驚風氣者，即頭面腫痛，額上有汗，是為小兒驚風。氣所傷而然，其口閉，脚冷，或大便黃，色不實，上唇乾者是也。此多因生下洗滌感受風冷而致也。急用葱湯淋洗其腹，揉葱熨臍腹間，良久尿且湧，自止。

乳香

治盤腸氣痛
乳香散
汶藥各等分共為細末以木香煎湯調服

脫肛

○一論小兒脫肛，皆因久患瀉痢所致。太陽頭自其間出而不收，是也。用葱湯薰洗，令軟，送上，或以五倍子末敷而頻托入，又以五倍子煎湯洗之，亦可。

○又方以鹽頭燒存性為末，香油調敷。一云以此物燒煙薰之，久久自收。又以陳壁土泡湯，先薰後洗亦効。提氣散方見脫肛門治小兒肝門脫下極効。

遺尿

○一論小兒遺尿朱禁者膀胱冷弱也。

益智仁七箇桑螵蛸七箇爲末酒調服用熟白果七箇送下。

故紙散 用被故紙炒爲末每服一錢熱湯調下。

○一治小兒遺尿六味丸加被故紙益智仁人參肉桂。

○一治小兒睡中遺尿不自覺者。

官桂爲末雄雞肝一具等分搗丸如小豆大溫水送下每白進三服。

○一治小兒遺糞用枯礬牡蠣殼等分爲末米湯調下。

尿濁

○一論小便尿濁澄之如米泔水也。

澄清飲

白朮 去蘆

白茯苓 去皮 白芍 炒

黃連 姜汁炒 澤瀉

山查 去子 各青皮 四分

甘草 生三分 生一分 煎水煎空心服

○一治小兒尿溺如米泔水

江南做酒小麴炒為末每服五分調酒下三服效

便血

○一論便血者熱傳心肺也凡初生嬰兒七日之內大小便有血出皆此由胎氣熱盛之所致也謂母食酒麴炙煖熱毒藥物流入心肺兒在胎內受之熱毒亦傳於心肺且女子熱入於心故小便有之男子熱入於肺故大便有之治法生地黄取自然汁入蜜少許和勻溫服男女皆然

○一方用生蒲黃油頭髮燒灰各一錢為末生地黄汁或米飲乳汁同服

下淋

○一論小兒下淋。乃膀胱有熱。水道不通。淋瀝不止。或尿如豆汁。或如沙石。或如米泔。如膏。或熱淋。尿血。

五淋散

赤茯苓

去皮

赤芍藥

二分

山梔子

二分

條芩

三分

當歸

二分

甘草

各五分

一方加生地黃

木通

滑石

車前子

各二分

右剉

一升

燈心

一團

水煎

溫服

吐血

○一論小兒吐血衄血下血宜用

黃金丸

黃芩不拘多少。為末。煉蜜為丸。如雞頭實大。三歲兒每一丸。鹽湯化。

○一治小兒吐血不止。

黃連末一錢。淡豆豉二十箇。水一盞。煎六分。去渣。溫服。量兒大小。加減。

○一治吐血衄血

栢枝散

栢枝晒乾

藕節晒乾

各等分爲末。三歲兒服半錢。藕汁和服。

匙白湯調下。

便閉

○一小兒初生。太小便不通。腹脹欲死。急令人以溫水漱口。淨口。吸乳兒前後心并臍下手足心共七處。每一處九三五次。漱口。吸乳。取紅赤滿度。須臾自通。不爾則無生意。

○一論小兒小便不通者。膀胱火盛也。

神通散

小便閉澀不堪言。爲用兒茶末一錢。蘆薈煎湯來送下。尋時溲便湧如泉。

○一治小便不通，腹脹欲死，野地蕨藜子不拘多少，焙黃色，為末，酒調服。
○又方用大麻燒灰酒調服。
○一論小兒大便不通者，戲腑有熱也。小兒風與熱滯，壅塞上焦，胸膈高起，大便不通。

沒藥散

沒藥

大黃

枳殼炒

桔梗銹

木香
甘草 各二錢

右剉碎，二錢薑三片，水煎服。

○一治新生小兒，十二日不大小便，用葱汁入乳各半，調勻，抹在口中，同乳帶下，即通。

○一揸膈法：治小兒大小便不通。

取連根葱白一莖，生薑一塊，淡豆豉二十粒，鹽一小匙，同研爛，搗作餅，子貼臍中，烘熱貼之，用絹帛扎定，良久，氣透自通，不通，再易一餅。

二妙散

六七月間尋牛糞中有蜣螂不拘多少用線穿起陰乾收貯用時取一箇要全者放淨磚上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下半截二便俱閉全用為細末新汲水調服。

腫滿

○一論小兒腫滿土虧水旺也并四肢腫滿陽水陰水皆可服。
加味五皮散

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓皮各一錢

加薑黃 木瓜各一錢剉散水煎服○下方去五加皮加薑皮桑

○一治小兒諸般腫脹。

黑牽牛半生半炒取頭細末每服一匙桑白皮煎湯磨木香汁調服

黃疸

○一論小兒黃疸寒熱嘔吐而渴或飲冷水身體面目俱黃小水不利不得安臥不重飲食
茯苓滲濕湯

茯苓

茵陳

山梔

黃連

黃芩

防已

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳殼

猪苓

各一錢澤瀉三分

水煎徐徐溫服○如小便不通

加木通如傷食不思飲食加神效麥芽砂仁

汗症

○一論小兒盜汗潮熱往來

胡黃連柴胡各等分爲細末煉蜜爲丸如鷄頭子大每下丸至三九銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮一二十沸放溫食後和渣服
○一治小兒虛汗或心血液盛亦發爲汗此藥收斂心氣

新羅人參

川當歸各三錢

右細剉用雄猪心丁箇切三片每服二錢猪心丁片并水一盞半煎食前作兩次服

○一治小兒盜汗因食生冷之物過多或熱水淘飯大能損土為水之所傷則不能制其津液故成汗自出也

牡蠣煨二錢黃芪蜜炙生地黃各一兩剉散水煎服

○一治小兒盜汗用五倍子為末津液調塗臍中二宿即止○又方用何首烏為末津液調塗臍內効

解顱

○一論小兒解顱者生下顱門不合也長必多愁少笑目白睛多面色晄白肢體消瘦皆腎虛也

○一治小兒顱顱開解頭縫不合此乃腎氣不成腎主骨髓而腦髓海腎氣

不盛所以腦髓不足故不能合○丹路治解頤以八物湯有熱加酒炒黃連生黃芩甘草水煎服外用布帛緊束及以白芩末傅之

人參地黃丸

人參二錢

懷熟地黃四錢 嫩鹿茸

山藥

白茯苓 去皮

牡丹皮

山茱萸 酒蒸去核各三錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大用酒煎湯研化食遠服

鶴節

○一論小兒鶴節因血氣不充故肌瘦薄骨節聳露如鶴之膝

當歸地黃丸

懷熟地黃 酒蒸八錢

山茱萸 酒蒸去核

乾山藥

澤瀉去毛

牡丹皮 去梗

白茯苓 去皮當歸酒洗各三錢

一方加鹿茸酥炙

牛膝 去蘆酒洗各二錢

右為細末煉蜜丸。按實大。每用熱水研化。食前服。仍以天南星炮去皮。臍研細末。入米醋調敷。絹帛上烘熱貼之。亦良法也。

行遲

○一論小兒行遲。肝腎虛弱。骨髓不充。不能行步。
加味地黃丸

懷熟地黃 八錢

山藥 四錢

山茱萸

酒洗去四錢

白茯苓 去皮

牡丹皮

澤瀉 各三錢

嫩鹿茸

酥炙

懷牛膝

去蘆酒洗三錢

五加皮 三錢

右為細末。煉蜜為丸。黍米大。每服一錢。空心溫湯送下。

○一論小兒稟受元氣不足。顛顛開解。肌肉消瘦。腹大面腫。語遲行遲。手足如荷。神色昏慢。牙齒生遲。諸遲。

調元散

乾山藥 五錢

人參

白茯苓 去皮

白朮

神

去皮木各三錢

白朮去蘆二錢 石菖蒲一錢 白芍藥炒 熟地黃黃

當歸 川芎 黃芪蜜炙各二錢半 甘草炙一錢半

右剉薑棗煎不拘時服嬰兒乳母同服。

語遲

○一論小兒語遲者心氣不足也 菖蒲丸

石菖蒲 人參 麥門冬去心 川芎

遠志甘草水炮 當歸 乳香 朱砂另研各一錢

右為末煉蜜為丸黍米大每服十丸食遠粳米飲送下。

齒遲

○一論小兒齒遲者腎不足也。

骨蒸散

川芎 乾山藥 當歸 白芍炒 甘草炙各二錢半
右爲細末每服二錢白湯調下食後服將此乾藥末擦牙齦即生

龜胸

○一論小兒龜胸者因肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸也又云綠乳母食
麵熟物五辛轉更胸起高也

龜胸丸

川大黃煨六分 天門冬去心

百合

杏仁去皮尖炒

木通去節

枳殼炙炒

桑白皮蜜炙

甜葶藶隔紙炒

軟石膏各一錢

右爲細末煉蜜爲丸每服五丸溫水化下食後服此服仍宜灸
兩耳前各一寸半上兩行二膏罈間六處各灸三壯春身從下灸起秋
冬從上灸起依法灸之

龜背

○一論小兒龜背者由兒生下風邪客於脊入於骨髓致成龜背也龜背並用龜尿點其骨節自愈取龜尿法用青蓮葉安龜在上用鏡照之其尿自出

龜背丸

枳殼麸炒

防風去蘆

獨活

大黃煨

前胡去蘆

當歸

麻黃去節各三錢

右為細末麵糊為丸如黍米大每服十五六丸看兒大小以米湯下食後服仍灸肺俞穴在三椎下兩傍各一寸半心俞穴在五椎下各一寸半膈俞穴在七椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節為一寸艾炷以小麥大灸五壯愈

○一治小兒龜背兒生下客風入脊遂於骨髓即成龜背治以龜尿點其

節即平取龜尿法用蓮葉煎龜于上尿自出

諸遲

○一論小兒行遲齒遲解頤顙填五軟鶴膝腎疳齒落睛白多愁凡此皆因稟受腎氣不足當以大味丸加鹿茸補之若因精氣未滿而御女以通多致頭目眩暈作渴吐痰或發熱足熱腰腿酸軟或自汗盜汗二便瀉痛變生諸疾難以名狀余常用大味丸八味二九及補中益氣之類加減用之無不奏効方見補益

○一小兒五歲不能言咸以為廢人矣但其形瘦瘠乃肺腎不足遂用六味丸加五味鹿茸及補中益氣湯加五味兩月餘形氣漸健將半載能發十二言至年許始聲音明朗方見補益

滯頤

○一論滯頤乃涎流出而漬于頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎自流不能收約法當溫脾為主宜服

溫脾丸

半夏姜汁炒 木香 五錢

丁香 二錢

白姜炒 五錢 白朮去蘆炒

青皮去穢 五錢 陳皮 五錢

右爲細末薑汁打稀糊丸麻子大每服三十九米飲送下

頤陷

○一論頤陷乃臟腑有熱渴飲水漿致成泄瀉久則血氣虛弱不能上榮腦骨故頤如坑不得滿平宜用

黃狗頭骨炙黃爲末鷄蛋清調敷之即合

頤填

○一論顙項者顙門腫起也脾主肌肉乳食不常飢飽無度或熱或寒乘于脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹顙突而高如物堆垛手髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牽輓熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量輕重兼以調氣小兒肝盛風熱攻心亦然未易痊耳

手拳

○一論手拳不展稟受肝氣怯弱致筋脉攣搐兩手伸展無力宜服

當歸

薏苡仁

秦朮

米仁

棗仁

防風

羌活各等分

右為末煉蜜為丸如鷄頭實大麝香湯化下量兒大小服之

脚拳

○一論脚拳不展所患腎氣不足榮氣未充脚指拳縮無力不能伸屈宜

川牛膝洗 山茱萸肉

人參

當歸身酒洗

牡丹皮

懷生地黃

補骨脂

右為末煉蜜為丸如茱萸大空心鹽湯送下

○一治富翁子八歲不能步履皆因看得太嬌放不著手兒身未得去氣

以致肌肉軟脆筋骨薄弱用黃土八斗夾襖內與穿內服地黃丸加入

參鹿茸牛膝虎膠骨服未半料兒能行矣

○一治小兒稟賦腎經虛熱耳內生瘡或肌肉消瘦骨節消露多節疳不

味丸加鹿茸牛膝各一兩五味子四兩若顯鮮不食牙齒不生眼睛不

黑腿軟難行最宜此藥

痘瘡

夫痘瘡者乃胎毒之所致也嬰兒在胎之時感其穢毒之氣藏於臟腑之
中發時有近遠之不同耳若值寒暄不常之候痘疹由是而發因其所

受淺深而爲稀稠焉。大抵始發之時，有因外感風寒而得者，有因內傷飲食而得者，有因時氣傳染而得者，有因跌撲驚恐而得者。大凡初起，未見紅點，與傷寒相類，發熱煩躁，臉赤唇紅，身痛頭疼，乍寒乍熱，噴嚏呵欠，喘嗽痰涎等症，身熱未明，疑似之間，急須表散，可服敗毒散，以微發其汗，則胎毒隨汗而解，而痘疹亦隨發而出矣。痘苗一見之際，則禁表藥，恐發得表虛故也。雖視痘之稀稠，稀者輕，不須用藥，而稠者重，宜以九味神功飲以化其毒，痘自出至平，宜此如減用之，能除諸病毒，已解盡。又看痘之起脹，何如？如痘不起脹，此元氣虛也，宜以保元湯主之，而痘必起脹。又看痘之貫膿，何如？如痘不貫膿，此氣血虛也，宜內托散加入乳好酒，此貫膿之巧法也。貫膿已滿，又看收靨，何如？若靨不嚴，不陷，黑陷，嘔吐白沫，爲表虛，宜木香散治之。若靨不嚴，寒戰咬牙，牙痛泄瀉，爲裏虛，宜與功散治之。有過服熱藥，以致熱毒猖狂，血氣壅盛，痘爛不靨者，宜小柴胡湯，猶是膏餅之收靨已畢，又看痘後有無餘毒。

若餘毒盛必因過服附子熱毒失解聚而不散以致渾身手足赤腫成
癰毒也宜消毒飲五福化毒丹治之又有毒攻發爲諸病宜隨症而治
之大凡瘡瘡七日以前爲裏實不可投溫燥之藥能助毒也八日以後
爲裏虛不可投寒涼之劑能伐生氣也但世俗不分寒熱但見瘡出不
快舉手悉用陳氏治虛寒熱藥殊不知瘡瘡屬燥熱者多急宜丹溪涼
血解毒治之若槩投熱劑豈無死者今不知致病之因又不求立方之
意倉卒之際據症檢方漫爾一試設有不應非其書而廢之不思之甚
也余觀陳氏其意大率歸重于太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足
太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易于外感脾土惡濕而無物不受觀其
用丁香薑桂所以治肺之寒用米附半夏所以治脾之濕使肺果有寒
脾果有濕而兼有虛也量而與之中病則已何傷之有今徒見瘡之出
遲者身熱者泄利者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒熱虛實半投木
香散異功散間有偶中隨手獲効或誤投禍不旋踵何者古人用藥

製方有綱道有監制有反佐有因用陳氏之方之時必痘瘡而扶寒者
其用燥熱補之故其宜也今未挾寒而用一偏之方寧不過於熱乎余嘗
會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方也若痘瘡虛寒淡白色
痒癢屬虛寒者宜用之若發熱壯盛齊勇紅紫色燥痒此屬熱毒宜涼
血自陳氏方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救痘是胎毒古
人治法只解毒然氣血虛則又送毒氣不出及不能成就故陳氏之法
既行而解毒之旨遂隱只顧救其虛寒之瘡而不能治其燥熱之瘡也
予思治法陳氏與丹溪寒熱兼用俱不可廢如紫陷灰白色紫戰
悶亂腹脹泄瀉者屬虛寒只用異功等方治之如熱盛紅紫紫癢屬熱
毒者急用涼血之藥消毒等散相兼而用之豈有不中其病耶予謂痘
疹乃小兒之酷疾生死反掌古人論之不一有見於寒者有見於熱者
學者不可執一而誤赤子之生何也蓋痘疹乃胎毒所致初生小兒失
於拭去口中穢毒者一誤也及長失於未用預解胎毒免痘之方者二

誤也。初起發熱有當汗而不汗者三誤也。將出之際有不當汗而汗者四誤也。既出之後有毒盛瀉解毒而不解者五誤也。起脹貫臍之時有當補虛而不補虛者六誤也。有首尾証平不當下而下者七誤也。有首尾實熱當下而不下者八誤也。有首尾虛寒當溫補而不溫補者九誤也。也有過服熱藥致痘瘡後餘毒瀉解毒而不解者十誤也。凡此十誤當預慎之務加通變故曰寒者溫之熱者涼之虛者補之實者瀉之又日化而裁之神而明之若斯治者庶免小兒夭枉之禍耳。

視痘顏色輕重之法

容谷而響應形動而影隨夫痘瘡之發也。內熱和緩達於外者必輕便閉煩燥彰於外者必重有諸中形諸外理勢之自然也夫顏色貴潤澤而嫌昏暗貴光彩而嫌枯澁貴淡紅而嫌黑滯貴圓淨而嫌破碎貴高隆而嫌平塌貴結實而嫌虛薄貴稀疎而嫌稠密根窠收緊痘分陰陽見點動活更怕臉浮出要參差血宜歸附耳後心喉少於他處為佳眉發

兩顴額前光潤不泄為妙一發熱便出者車瘡夾疹為半輕半重外微紅者輕外黑裏赤者微重外赤裏黑太重瘡內黑點如針孔者勢極青乾紫陷昏睡汗出煩燥熱渴腹脹喘喘大小便閉者困也善治者觀其形色而辯之輕者獲安重者能取効矣

痘疹辯疑賦

胎毒蓄積發於痘瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽壬水克壬丙丁後歸陽明血水化為膿漿勢若然肩變如反掌若救焚兮從新何如焦額如落承兮拯溺不及寒裏欲知表裏虛實須明寒熱溫涼証候殊形臟腑易狀肝火激成水泡肺主燥而膿漿心斑紅紫脾疹赤黃經居下不受汚濁為變黑而可防觀其內症推乎外臟呵欠煩悶兮肝木之因咳嗽喘噴嚏兮肺金之象自帶赤兮心火延於兩脇手足厥冷而昏睡兮脾土困于中央耳尻屬腎溫暖如常二處灼熱痘症垂張先分部位次察災祥陽明從自落鼻太陽形於頭上心火炎熱則舌乾而

赤肺金鬱結則肺膈先傷手足屬乎脾胃肝膽主脇肋之傍頸項三陽
 交會腰背統乎膀胱外症明分用心想像泄者邪盛于下吐者邪甚于
 上氣逆而腹脹隱隱毒甚而腰痛惶惶心熱甚而驚搐胃邪實而顛狂
 口燥咽乾肺受火邪而液渴便閉尿澀腎因火旺而津亡欲識痘之輕
 重當觀熱于形狀毒甚兮心如灸上毒微兮內外清涼寒熱往來神氣
 爽定知痘出必禎祥數番漸出兮春回陽谷一齊湧出兮火烈豈岡蚕
 蟲蚤斑刻期而歸陰府蛇皮蟬退引白而返泉鄉雖珀紫紅最嫌灰白
 最宜淡紅滋潤切忌黑陷乾黃色要明潤兮猶恐薄嫩之易破痘貴乾
 結兮又愁痒場之難當面煩稀而磊落清安可保脫胸密而連串吉凶
 難量頂要平圓不宜平陷漿宜飽滿切忌空瘡皮喜老而愁嫩唇愛活
 而怕光結實高聳始終無虞丹浮皮肉必主刑傷唇面預腫兮八九如
 何可過腰痛胃爛兮丁七定主災殃瘡堆口舌毒纏頸項咽瘡喉腫飲
 食難嘗瀉痢膿血毒甚無救人力難盡天命匪張痘瘡焦落辨別陰陽

人中上下先驚為良足腰先若黑屬多凶而少吉祥。

神斷秘訣

細嫩無分地
皮膚無光亮
痘腫皮不腫
滿面皆稠密
頭身色不潤
初起瘡貼肉
見點如刀樣
頭面方見大
十四痂堪落
日中光射斗
五經穴瘡上

粘連一片紅
胸前不空陷
眼開口又開
仔細看陰陽
膿綠臭難當
起後肉難通
焦枯黑陷傷
頂刻又尖長
依然乾燥膿
手足亂抽搐
斜視睡不分

七朝虛癰塌
一身紅紫泡
陰陽俱無縫
天庭漿不足
此般脾氣絕
寒熱不分別
心腎二經絕
此般形像見
沉沉睡不食
若逢有此疾
總然與辭壽

乾燥定無膿
九日待西天
六日一場空
此兒必有傷
不冬命須亡
癰塌七朝中
此痘火中央
不美有奇方
延日不能生
不日命須傷
遲日一場空

舌尖上見黑
目白睛紅赤
初見雲中月
膿黃色不活
勝凸四肢浮
仔細看身疔
十四痧該落
見點如川樣
目定神昏熱
舌上浮血點
如神真秘訣

心經冠肺經
唇紅豆三般
雲中隱隱丹
乾極脚攤紅
睛黃赤鼻頭
咽痰前後心
膿瘡食不進
針苗接一連
喉痰膝下水
喉瘡熱不清
學者要精明

皮紅胭脂樣
黃漿胃先腐
兩朝三日後
牙疳瀉不食
類般顏色異
陰陽并腦後
無神死蛇臭
乾紅主絕水
飲湯并下瀉
皮紅痘不起

半月此兒亡
焦裂飲茶終
兒命待西天
半月命須終
十五命難留
腎舌頂陰生
兒命必身連
十命九難延
頃刻命難存
心經克肺經

延生第一方

● 預解胎毒免痘門

○一論小兒初生臍帶脫落後取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡放
地上上用瓦蓋之類蓋之存性研為末預將朱砂透明者為極細末水
飛過臍帶若有五分重朱砂用二分五釐生地黄當歸身煎濃汁一二
蜆殼調和前兩味抹兒口上臍間及乳母乳頭上一日之內晚至盡次
日太便遺下穢污濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾生一子得一子十
分妙法也

○一論小兒未出痘疹者每遇交春分秋分時服一丸其痘毒能漸消化
若只服一二次者亦得減少其毒盡能消化必保無虞此方神秘本不
欲輕傳但慈幼之心自不能已願與四方君子共之

神効消毒保嬰丹

纏豆藤一兩五錢其藤八月間收或生或乾上纏莖 黑豆 三十粒
赤豆 七十粒 山查肉 一兩 新升麻 五錢 荆芥 五錢 防風 五錢
生地黃 一兩 川獨活 五錢 甘草 五錢 當歸 五錢 赤芍 五錢

連翹七錢五 黃連五錢 桔梗五錢 辰砂水飛一兩 牛旁子一兩 苦絲瓜可瀰

右為極細末和勻。用砂糖拌丸。李核大。每服一丸。濃煎甘草湯化下。其前項藥須預辦。精料遇春分秋分。或正月十五日。七月十五日。修合。務在精誠。忌婦人猫狗。合時向太陽祝。藥曰。神仙真藥。體合自然。嬰兒吞服。天地齊年。吾奉。太上老君。急急如律令。勅。一氣七遍。

全生保安散 曾府秘傳治小兒不出痘疹

麻黃

羌活

防風

升麻

生地黃

黃柏

酒浸各川

藁本

乾薑

蒼朮

黃芩

酒浸 生芩

柴胡各二分 紅花

細辛

蘇木

白木

陳皮各一分 甘草

歸身

黃連各三分 連翹

吳茱萸各半分

右判一劑。立春立夏立秋立冬之日。水煎。露一宿。次早溫服。如一年之

內依時服此四服神效永不出痘。

滌穢免痘湯

太尹王太中傳自方上異人

十月經霜後取練樹子一升收貯到正月初一日半夜子時父母只令
一人知將練子入鍋內用水煮湯待溫洗兒全身永不出痘真秘方也
鄉隣出痘預服禁方

一凡鄉隣覺有時行痘疹可以預防宜節其飲食謹其起居加減衣服預
其藥餌亦制節謹度順天之道也。

蘇油擦法

用蘇油每夜臨卧時以手中三指蘸油擦兒頭額項背腰兩手腕兩足腕
然發睡即可以便輕此亦暢達流通并脫凝滯之義也

三豆湯

大黑豆

赤小豆

菹豆

各一盞甘草一兩細切每日用四味瓦甌水煨熟爛連湯與兒食

之黑豆鮮腎經之毒制相火也赤小豆鮮心經之毒制君火也菹豆鮮陽明經之毒制胃火也用豆者又以形治以類從也易簡而便則開食治以便資藉其為神巧矣乎。

永不出痘三五散 賈蘭峰傳

用有雄鷄蛋七枚內取一枚開一孔去清黃淨裝入鮮明好朱砂四錢九分其孔以紙糊用雞抱出雞雛將朱砂採目精月華各七日夜收貯聽用用起頭結絲瓜一個侯老成種乾煨燒灰存性為末每服朱砂五分絲瓜灰五分為細末蜂蜜水調服服過三次永不出痘疹鄰家出痘就宜服之。

油飲子

若遇痘疹行時左右隣家有出者可預服之用真香油一斤煎乾遂月與兒飲盡永不出痘。

痘後筋紋斷法

凡耳後筋紋似水紅色爲上赤紅色次之太紅色宜退火紫重青色青不治
又須條均直上耳尖而無分枝者爲上若分枝纏繞者雖淡紅亦治其
或過髮際者多不可救

紙撚照法

用學書竹紙或燒錢草紙烘乾作撚子如小指大蘸清油于燈上往來薰
炙令紙條無泡不濕咤又飽蘸油又薰熾令油無泡卽點撚子將患右
房內燈門閉令黑暗有光處以蔽之看其左額有何色點右額有何色
點中庭有何色點觀兩額宜以撚子在兩耳邊及鼻邊平照觀中庭宜
以撚子在兩目角平照看其皮中隱隱可指是赤是紫是塊是點撚然
明白若是麻疹則浮于皮外肉內無根若是痘瘡根在肉內極深若以
撚子當額及中庭正照則黯而不見撚子有灰影卽指去今明如此照
之病情在內者可以預見若日間以天日光觀之則不見矣

初起發熱治法

一論發熱之初。急宜表法。使機時。胎毒及外感不正之氣。壅塞壯熱。頭眩。腰痛。腹脹。或喘嗽。痰涎。鼻流清涕。或因驚恐。跌蹠。而發。搐搦。角弓反張。上宮天串。一切內外所感。盡從汗散。則痘出自然稀少。但熱甚者。其毒亦盛。熱微者。其毒亦微。然表藥必在紅點未見之前可服。

敗毒散

升麻

乾葛

紫蘇

川芎

羌活

防風

荊芥

前胡

薄荷

桔梗去蘆

枳殼去穢

牛蒡子

蟬退

山查肉

地骨皮

甘草

右判下劑。生薑下片。水煎。臨服加葱白汁五匙。熱服。○一方無乾葛。加紫草。○如熱甚。加紫胡黃芩。○冬加麻黃。○暑月加香薷。○瀉加猪苓澤瀉。

○一論小兒痘疹。纔覺發熱者。服之不出。見苗者。服之出。種開天者。服之。

起死回生不可言

神効復生丸

方伯主如水傳

當歸身

西芎

升麻

乾葛

白芎

人參

黃芪

甘草

辰砂

錢一兩二紫草茸一兩

右為末糯米粽為丸如雞頭子大每服下丸河水煎滾入黃酒少許

○一論痘初發熱下服即輕百發百中

預服回生丹

紫草茸一兩

山豆根

五錢升麻小者

葛根

蟬退淨者

姜蠶少去絲白附子

連翹

去心各全蝎去毒十生甘草五分

雄黃

分一錢五麝香一錢

蟾酥

一錢好酒調化如蜜

右十味為末用蟾酥丸如皂角子大每服下丸紫草湯下

○一論痘瘡初出先用此藥塗面若用之早則痘瘡不生於面用之遲雖

出亦稀少

玉顏膏

黃柏酥皮一葉豆粉四兩甘草生四兩紅花二兩

右爲末香油調成膏從耳前眼唇面上並塗之，日三五度。

出痘治法

避穢氣

腋下狐臭氣 房中淫涉氣 行遠勞汗氣 溝渠瀾惡氣

婦人經候氣 諸瘡腥臭氣 硫黃蚊煙氣 吹滅燈燭氣

誤燒頭髮氣 柴烟魚骨氣 葱蒜韭薤氣 煎炒油炮氣

醉酒葷腥氣 麝香燥穢氣

又禁忌

生人往來 罵罵呼怒 對梳頭 對搖痒 勿掃地 勿對荒言

勿飲食甜藥 勿備道師入房

以上幾氣禁忌諸條謹之，則痘可變輕，不謹則輕變重矣。

○一論外解諸方。凡被房事經水生產之穢所犯者以太葱燒煙解之。
凡被五辛厭者以生薑燒煙解之。凡被酒厭者以爲根茵陳蒿燒之。
凡被死屍之氣及厲氣所犯者以太黃蒼朮燒煙解之。
凡被胡臭木羊厭者燒楓葉解之。
凡遇風雨燒蒼朮楓葉避之。

凡一切惡氣通以乳香燒煙薰之。仲景曰。小兒痘時宜燒乳香辟穢惡氣。蓋藥衛遇香則行遇臭則凝故也。

世俗煮醋薰豆謂其能活血然醋氣收斂故婦人血崩者用薰之痘疹欲升發而不欲收斂故不宜耳。嘗見用醋薰痘疹者搖破而膿血出。○一論痘疹初出時宜用此酒遍噴四圍床壁及與患者服役人皆飲能辟穢毒又以淨胭脂點兩眼角防痘入眼。

胡蔓酒

胡蔓二兩細切以酒二鍾煎沸用紙密封久氣出候冷去渣從頂

至顧鎖微微塗之更噴背脊胸腹及兩脚背遍再用蒲扇壁門戶遍酒之尤妙

○一論痘瘡欲出已出熱尚未解毒氣太盛稠密成片急進此三四服快透消毒如神專治內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫壅毒聚遍身風疹癰毒赤痛等症

消毒飲

牛旁子 微炒四錢 荆芥 甘草各一錢 防風 去蘆半錢

一方加黃芩一錢 犀角 鎊五分

右剉水煎溫服

○一論痘瘡已出痘毒太盛以此消毒或出不快皆宜服之二云痘瘡欲出渾身壯熱不思飲食若服此一劑即內消已有二兩顆即解其毒若全出即當日頭焦只三服瘥于每用此治壯盛小兒痘出毒盛殊効若虛者宜神功散尤妙

化毒湯

紫草茸五錢

川升麻

甘草各二錢半

右剉每服二錢糯米五十粒同煎服。

○一論瘡出毒氣太盛血紅一片不分地界如蚊蚤種或諸朱血或吐瀉七日以前諸症可服解毒神效。

九味神功散

黃芪

人參

白芍

紫草

紅花

生地黃

牛勞子各等分前胡

甘草欸半

右剉水煎溫服渣再煎服。○熱毒者加黃連黃芩各一錢未退再加大黃。○有瘀血者加桃仁。○若頭粒淡黑色者有寒乘之加桂一錢。如太便閉加大黃。

一痘發渴服神功散不渴或猶渴者用紅花子一兩煎湯服之。紅花亦好加牛勞子尤妙蓋能散胃中之瘀血故也切不可用別藥。

能助陽經之火大發洩者用真黃土百沸湯碗蓋泡取出水少加炒糖飲之立止

一痘出三日內頂陷者非虛也用神功散活血退火

四日以前有寒症其色黑慘係元陽加桂

色白尤者寒乘之神功散加桂

腹痛者寒盛也神功散主之

面紅不退地界不分者神功散倍前胡

吐者非盛乘火炎而宣也神功散主之

泄瀉者火盛而奔越也神功散加升麻以提之

一身已涼汗不止者血隨氣溢也用當歸五錢黃芪三錢酸棗仁炒一錢

作一劑水煎服立止

一有痰閉曰附子磨服切不可用一陳陽使燥陽明經使孤陽無陰不能

粒化也

一 熬用杏仁煎湯磨白附子服即止

一 遍身疼痛者以木香一味磨服即止

一 藥行作痒此內熱而外為感寒所乘用荆芥穗紙裹緊米糊粘住紙頭令不散燈上燒了却于桌上擦去灰快放手指定痒瘡頭點痒處一下即放退無痒瘡點之立止

一 行漿紫足而發疔認定是黑疔症或黑而硬或有紅絲或為太紫泡未曾解毒者仍以神功散加雄黃黃連黃芩大黃煎服却用點法雄黃二錢研胭脂重浸水金銀調雄黃末點亦頭上立時即紅活亦神法也蓋雄黃能解毒胭脂能活血也

一 痘九日十日作瀉先失解毒者宜用

定中湯

真正黃土一大塊碗盛以百沸湯泡即以碗蓋少傾出用如冷候於藥內外以熱水盪之加入雄黃二錢朱砂五分二味為末和勻以黃土湯

兩匙少加沙糖溫服二服立止。

一論痘疹腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身濕渴者或身熱面皸白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不止者已上九證即非熱也乃脾胃肌肉虛寒液衰少故也休將散主之如不愈更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發表其表裏俱實而瘡不致於痒塌喘渴而死矣。

一痘十二日當靨不靨發熱蒸蒸者宜用

甘露回天湯

沙糖半酒鍾百沸湯調一大碗溫服立時熱退豆靨萬發萬中真有

回天之力也。

看痘不治法

初出勇壯者不治。○出如傘種者不治。○隨出隨沒者不治。○如蚊蟲咬者不治。○氣血相失者不治。○倒出者不治。○飲水如從鼻者不治。與

肺氣不逆也

有痰喘歌

輕者熱輕病亦稀

小大後先出不齊

根寒紅治絕情

飲食如常勿藥宜

重者熱中寒並出

密如蟻聚若肝膽

根白頂紅是紫黑

若逢血治尚堪醫

○起脹治法

保元湯

人參 去蘊二錢

嫩黃芪三錢

甘草一錢

右剉二劑生薑一片水煎溫服○一當起脹而不起用紫山烏為末

研末二錢酒調服○一血弱不起根底淡薄以保元湯加丁香三錢以

桂丁錢歸二錢小荷丁錢水煎溫服

二日初出圓草成形乾紅少稠黃雖犯土其氣血未離以候其氣血交

會也然毒尚淺急以保元湯加桂枝湯治血勻氣之劑如毒若腐生瘡

之藥治血加膏歸五白芍一錢白氣加陳皮五分鮮薑加芍七分牛
麥子七分水一盞煎七分溫服

二三日根葉雖圓而頂陷者血亦難聚為氣虛弱不能領袖其血也以保
元湯加川芎官桂扶陽抑陰豈有不痊者哉

四五日根葉雖起色不充澤生者猶任為氣弱血盛以保元湯加芍藥官
桂糯米助衛制榮斯為調燮之妙也

五六日氣盈血弱色昏紅紫以保元湯加木香當歸川芎助血歸附氣位
以全中坤之道也

六七日氣交下血雖歸附不能成聚為氣血少寒不能制急投保元湯
加官桂糯米助其成聚而收旁惠之偉功斯為治矣

七八日毒化聚而不消為氣血有凝不能大振以保元湯加官桂糯米
桑陽助聚斯可謂保全生命矣

一痘至此主貫膿膿已消雖有他証亦不壞生者無膿灰暗雖無他

症亦死

一痘瘡至八九十日視痘頂心上有一點如水珠見出此痘漸無氣可醫死症也

八九日漿不冲痛血附線紅氣弱而險也以保元湯加糯米以助其氣而駕其血斯漿成矣

十一二日氣血冲痛血上漿足濕潤不斂者內虛也以保元湯血亦有力加白朮茯苓助其收斂而結痂也

十三四日毒雖盡解漿老結痂之際或有雜症相仍以保元湯隨症加減不可峻用寒涼太熱之劑恐致內損之患故也

十四五六日痂落潮熱唇紅口渴不食以四君子湯加陳皮山查黃連如渴甚以參苓白朮散加熱不解以大連翹飲去黃芩主之症去之後多有內損或餘毒未解此則尤為難治也

凡痘瘡發渴者為虛弱而津液枯竭也保元湯加麥門冬五味子即止如

不正以參苓白朮散工一劑即止

凡痘瘡不起發膿漿不厚保元湯加川芎五分下香四分夏月二分糯米

二百粒煎熟加好酒人乳各半盞同服

若頭顱不起脹加川芎六分爲引○若面部不起脹加升麻四分爲引○

若胸膈不起脹加桔梗四分爲引○若腰膝不起脹加牛膝四分爲引○

○若兩手不起脹加桂枝二分爲引

○一論痘瘡胃虛不進飲食或口乾發渴或吐瀉等症

參苓白朮散

人參

白朮去蘆炒白茯苓去皮甘草炙

白扁豆炒

蓮肉去心

山藥炒各一錢五分

桔梗八分

薏苡仁八分

砂仁七分

右爲細末每服五六分或一錢紅棗煎湯調下或姜湯亦可

貫聰治法

○一論痘瘡血氣虛損或風邪穢毒冲觸使瘡毒內陷伏而不出或出而不勻快此藥活血勻氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易靨

內托散

黃芪

人參

當歸各二錢川芎

防風

桔梗

厚朴姜汁炒白芷

甘草各一錢木香

官桂各三分

右方如紅紫乾燥黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩用此藥調
穿山甲炒成珠為末五分同服

若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏官桂枳殼○當歸身而不可
貫膿者倍參芪當歸煎熟臨服入木乳汁好酒同服此藥服之功
法也○泄瀉加丁香乾薑肉豆蔻

○一論痘瘡已成出齊而難脹或已脹發而難靨者由內虛故耳蓋痘既
出灰白色及頂平不起或陷伏者氣血大虛也宜此方

歸身湯

嫩鹿茸酥炙當歸身酒洗 每剉五錢好酒煎溫服

○一論痘屬虛寒八九日色白如水泡頂陷根白痒塌寒戰咬牙等症

回陽酒

鹿茸酥炙 大附子剉包煨去皮臍 嫩黃芪 當歸酒洗

右剉好酒煎溫服

○一論痘出至發膿收靨之時倒塌陷伏心慌喘急悶亂死在須臾

好揀參丁兩水煎濃汁灌下即甦

○一論灰白黑陷嘔吐白沫為毒虛

木香散十一味

木香磨 前胡 甘草炙

大腹皮 人參五分 陳皮

半夏姜製八分

赤茯苓去皮訶子煨取肉 肉桂各八分丁香雄者五粒

右判一劑生薑三片水一鍾煎八分溫服○嘔吐甚加白豆蔻去殼
○一論寒戰咬牙疰瘳場泄瀉為裏虛
與功散十二味

當歸酒洗

肉豆蔻

煨去

陳皮

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

大附子

炮煨去

半夏

姜汁炒厚朴

姜炒

肉桂

各八分

人參五分

小丁香

七粒

木香

磨八分

右判一劑生薑三片棗一枚水一鍾煎至八分溫服○泄瀉甚加

○一論此方能發瘧之聖藥也治紅斑黑陷頂不起瘰癧一切惡瘡危
者用此立見起死回生之功也

小靈丹

雄黃

朱砂各二錢乳香

沒藥

各一錢五分

大蟾蜍取心肝尾焙乾三錢

麝香三分

右研細末取猪心血雞冠血丸如皂子大每服一丸身無太熱生酒化

下熱甚不飲酒者紫草燉心湯下即時紅活而起如服此不効者決無可生之理也

一論痘疹初出光壯忽然黑陷心中煩躁氣急喘滿狂言妄語如見鬼神急宜治之不然毒氣入臟必死

人牙散

人牙燒包裡

為細末每一箇作一服酒調下立効

又秘方用人牙一箇火煨

朱砂三分

雄黃三分

為細末先用

甘草為末煨成膏調入三味再用無灰好酒調稀灌下治惡瘡瘰癧不發危急之甚服之立効

無價散 治症同前

人牙

猫牙

狗牙

犬牙

右等分各將炭火燒留烟在碗蓋蔽存性為末每五六歲服三四分好熱酒調下疳塌寒戰泄瀉者煎其功散調下若無猫牙用前人牙下味

亦好但不如四生金方。

○一論痘疹咬牙寒戰六七日陷而不移。不覺腰膝入黑色。氣欲絕者。神効。有瀉者不強服。

三仙散 趙蕙真江傳

穿山甲半斤。用好漿兒酒一斤。以山甲微火炙乾。再浸再炙。以酒乾為度。穿山甲一兩。麝香一分。朱砂。

右為細末。每服五七分。或一錢溫酒調下。○一方治前症。單用穿山甲用炭火炒成珠為末。每服五十分。木香湯調服亦効。

○一論痘疹紫黑乾枯。變黑。身如火炙之熱。不瀉者可服犀角散。果竺陽傳。

烏犀角

羚羊角

二味磨水服之。有回生之妙。

○一論痘疹不出。黑陷。於死前可服。

萬金散

人猶猪犬臘嚴燒少許微將藥水調百者救生無二死黃金鼎

錠也難消
右將前四物的糞於臘日早晨日未出時貯於銀鍋內用炭火燒令烟盡為度但是瘡發不快倒靨黑陷者及下切惡瘡每用一字蜜水調服其効如神

○一論瘡瘡自出至收靨時理不宜下者用此導之若既靨之後有前症者又當下也

○一論瘡瘡中有長大紫黑者為赤毒把住症不起發急用簪挑破後入

四聖散
珍珠五粒鐵器上煨苑豆因十九粒燒頭髮燒存性不拘多

右為經末用擦面油調成膏子將兒在溫煨處少存忌風寒穢氣先用簪尖平撥開瘡口將藥紙入疔內即變紅色餘瘡皆起但挑破出血或挑開用口吮去黑血或用綿裹指拍去黑血即愈蓋破疔而毒

氣得散也

一女子出痘至脹滿時多紫黑抓破流血此痘毒大盛用皮硝不拘多少入花椒下搗碎家用青布蘸搭患處頻頻良以即起脹如舊

收靨治法

一凡痘十日十一二日痘漸收靨自上而下為順自下而上為逆其遍身皆靨雖數顆不靨尚能殺入猶蛇退皮雖一節被傷不能退者即是死也

一十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧則順氣煩渴咬牙異功散加木香當歸以救陰陽表裏若以蜜水西瓜紅柿等為物食之連死

一凡當靨不靨而泄瀉寒戰咬牙抓破此虛寒也宜異功散

一凡過服熱藥以致熱毒猖狂血氣壅盛痘爛不靨者內服小承氣湯

猪尾膏鮮之外用敗草散付之

○一凡瘟不收騰氣急上痰聲啞目閉無神者死。後癰紅者吉。白無血色者毒氣歸內也。恐生餘症。

一治瘟瘡抓搔成膿血淋漓宜

敗草散

用蕪房多年爛草或蓋牆爛草亦可其草經霜露感天地陰陽之氣并解瘡房其功不能盡述取草不拘多少晒乾或焙乾為末貼瘡上若通身瘡破膿水不絕貼衣裳難以坐卧可用土升攤於席上令兒坐卧其効如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

硝膽膏

硝膽膏口不收患處塗之病自瘳

瘡癰鼻爛血膿流

宜研猪膽芒硝細

猪尾膏

龍腦

研細成泥，清猪心血，調在辰砂，為大紫葦湯化下。

○一治痘疹抓破，和爛。

用蠶乳，內入土蜜，新瓦上焙乾，煨灰，存性，為末。如濕乾，搽如乾，

○一小兒三歲者，發熱七日，瘡出倒靨，色黑，唇山，水冷危症也。祈福求神，無所不至，遇逢一土曰：此疾有藥，可起。以少許，俾服之，移時，即紅活如常。不吝寶，求其法用，狗蠅七枚，搗細，和醪酒，少許調服，雖夏月極多，易得，冬月藏於耳中，不可不知。此蠅，夏月狗身上飛者是也。

○一痘疹屬虛寒者，直可延至十數日，後方死。屬毒盛轉色者，不過七八日，蓋痘是胎毒，自內出外，一二三日方出，發毒氣尚在內，出至六日，則常盡出於表，七八九日成膿，而結痂矣。若毒氣盛，不能盡出，過六七日，反內入臟腑，故須以六日以前，毒氣該出之時，急用涼血解毒之藥，以驅出之。六日以後，發無及矣。故其死，最速者，痘毒氣少者，只是氣血不足，不能昇騰成痂，故結痂遲，且久而後死。此虛寒輕重之分也。

痘後餘毒

小兒痘疹餘毒輕則肌表津淫癢痒重則肢節壅腫作痛若發熱而大便秘結者消毒飲發熱而大便秘調和者清熱消毒散大便秘調和而渴者麥門冬飲腫痛發熱而渴者仙方活命飲大凡根赤而作痒者血虛也四物湯加牡丹皮色白而作痒者氣虛也四君加當歸芍藥色赤而作痛者血熱也四物湯加連翹金銀花色白而不燃痛者血氣虛也托裏散不成膿或不腐血氣俱虛也八珍湯膿既潰而不斂脾氣虛也六君子湯按之隨指復起者內有膿也即刺之勿使內攻膿出兒安不必服藥如膿稀清或反作痛或倦意熱渴或作痛等症皆屬氣血虛甚急以參芪犀朮之類補之若虛中見惡症者不可救實中無惡症者多自愈

活命飲

托裏散

方見癰疽

○一論痘後餘毒或先服陷子熱毒失靜聚而不散以至頭頂胸背手足肢節赤腫成癰毒者宜消毒飲或五福化毒丹

清毒散

鼠粘子炒

荆芥穗

甘草

防風各五分 犀角 鎊米二分

金銀花三分

右劉水煎服。

一論瘡後餘毒未解頭面身體多生瘡癰，焦熱難瘳，唇口腫破，生瘡牙齦出血，口臭，咽喉腫痛，口渴等症。

五福化毒丹

犀角 鎊三錢

桔梗一兩

生地黄

赤茯苓

牛蒡子各五錢

連翹六錢

玄參三錢

青黛二錢

朴硝

粉草各三錢

右為細末，煉蜜為丸，如龍眼大，每服一丸，薄荷湯化下，茶清送下，忌食辛辣。

一論瘡後不問瘡毒發於何經，初起紅腫時，却用黑紫赤三豆以酸醋

浸研漿時，以鷄翎刷之，隨手退去，其效如神。

一論一切癰疽陽症腫痛發熱作渴，

清熱消毒散

連翹

山梔

黃連

當歸各五分 川芎

芍藥炒

生地黃 各六分 金銀花 一錢 甘草 二分

右剉一劑水煎服

○一論瘧毒發熱作渴咽痛

麥門冬飲

麥門冬 洗心 黃芩 三分 甘草 五分 人參 玄參 各三分

金銀花 五分

右剉水煎服。○咽痛加桔梗五分

○一論痘後未肯不出

天花粉

桔梗

白茯苓 去皮 訶子肉

石菖蒲

甘草

右為末水調半匙在碗內外以水竹七葉煎荆七條縛作一處點火在碗內煎臨服時服

○論瘰癧瘡。瘰癧瘡。其瘰癧瘡。或凸或凹。用白礬。塗於瘡上。其瘰癧。易落。且無邪氣。可不必移。

○一論瘰癧瘡。後身。體及肢節。生瘰癧瘡。水不乾。用出。秦龜。絲。煎。不。拘。多。少。用白礬。研碎。塞入。瘰癧。內。令。潮。以。炭。火。燒。候。白礬。汁。乾。取出。研入。麝。少。許。每。用。乾。貼。瘡。上。若。不。早。治。則。潰。難。潤。

○一瘰癧瘡。入眼。成。翳。用。蟬。退。為。細。末。羊。肝。煎。湯。調。化。食。後。服。

○一瘰癧瘡。後。眼。生。翳。膜。○凡瘰癧瘡。不可。食。雞。鴨。卵。即。時。其。瘰癧。手。其。瘰癧。如。神。不可。不。戒。

撥雲丹

虎糞。苦。花。盧。花。色。者。佳。

蟬退

木通

白茯苓。各二兩。

炙甘草。一兩。

右為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服八十九。食後。白湯下。日進三服。以愈為度。

○一論後發毒眼生翳障
通明散

當歸

川芎

芍藥

生地黃

防風

乾葛

菊花

蟬退

天花粉各等分

穀精草倍

右剉散水煎服眼赤腫加黃連梔子翳膜加木賊

秘方

黃丹

輕粉各一錢

右為末用蠟管吹如左眼患吹入右耳右眼患吹入左耳一日吹三次
兼服通明散或用雌雄檳榔磨水服之効

一治癰疹傷眼有白翳

用清涼散水點之立愈

○一論眼赤在眼內者則發熱發熱服

陳皮中

半夏姜製中貝母上

天花粉上

麥門冬去心上

桔梗上

梔子炒

黃芩各等分甘草生下

右剉水煎食遠服

○一論小兒瘰癧後咳嗽不拘遠年近日者有此失治乃貽終身患也

白砒一錢

雄黃

板礬

燕管石

石黃

寒水石火煅各一錢

右研細末用菜豆粉打糊丸黍豆大每服三九臨臥井水送下忌熱物

一夜無妨

補遺

鹽府秘傳冲虛至寶丹

●治瘰癧初起氣血兩虛倒場黑陷不起不分地界或咳或瀉或喘

紫葦茸八兩荊穗八兩

當歸四兩

鮮笋一斤

紅花

木通

麻黃

白芷

白芨

牡丹皮

赤芍

懷生地

牛勞子

甘草各四兩

右共咀片用水三十碗

鍋內煎去二分起來再入水十碗煎至五碗去

渣共煎汁煎滴水成珠加蜂蜜四兩煎成珠為度聽用

梅花蕊半兩

蟾酥三錢

紫河車一具

酒煮成膏所養蚕炒一兩

金蠟酒洗

穿山甲炒

川黃連酒炒

杏仁另破尖黃芩

蜂房炒

連翹炒

地膚子炒

大胡麻已上各一兩

右為細末煎膏一斗為丸如龍眼大每用一丸鮮雞湯下立起分地而

奪命象皮丸

益瀋傳

治氣不足空殼無驪丁九即有

象皮用一兩酒炒磨下

穩小鴛即鴛鴦也皮煨黃色為度用

大附子五錢童便煮

黃花地丁酒花二兩

人參五錢

血竭五錢

沉香二錢

麝香三分

冰片一錢

馬橫榔五錢

生黃五分

黃芪五錢

細辛五錢

麝干一兩

官桂二錢

鹿茸五錢 辰砂三錢 真金剛引一小者無核 木香二錢

白附子二錢 仙茅一兩 黑豆汁煮 甘草五錢

右為末白酒醉打和米糊為丸如龍眼大每下九酒化下立起

神仙救苦丹 蓋濟傳

治癰初起三五日熱不出又瀉又咳嗽喉痛腰痛或癰或瘰皆可以治如症初出葱白湯下驚風泄瀉咳嗽痰喘如神

白附子五錢 山東者佳 大竺黃二錢 全蝎二錢 膽星一兩

姜蚕炒一兩 肉豆蔻五錢 柯子麩包煨去核五錢 麝香一分

麝香五錢 蒲公英花五錢 朱砂一錢 雄黃二錢

川黃連二錢

右為細末煎膏為丸如龍眼大金箔為衣滾水化下

起死回生散

治癰瘡至七八日忽然變黑收入腹內遍身抓破吮喘死在須臾服此

從新另發出立可回生扶清龍神仙傳

當歸

川芎

白芍

生地黃

升麻

紅花

上陷加白芷

下陷加生藤

遍身黑陷加麻黃象糞微炒如一歲兒用二錢大則用二三錢
右到一劑半水半酒煎服從新發出脚上有黑疔至七八日用針挑去
以太乙膏貼之即拔去毒連進二三服

麻疹

古謂麻即疹也疹時如麻成桑痘時如痘成粒皆象其形而名也夫胎毒
一也痘出於五臟臟屬陰陰主血故痘有形而有汁其症寒熱備有也
疹出於六腑腑屬陽陽主氣故疹有形而無漿其形多實熱而無寒也
為症既異則治法亦殊痘宜內實可用補劑疹忌內實只宜解散惟初
熱發表略相似耳既出之後痘則補氣以生血疹宜補陰以制陽何也

蓋疹熱盛則陰分受其熬煎而血多虛耗故治以清火滋陰為主而不
可少動其氣所以人參白朮半夏若燥悍之劑宜深忌也世知瘡
證所繫之重而不知疹之殺人尤甚者甚多忽而不備良可太息矣
○一論疹發熱之初多似傷風惟疹子則救咳噴嚏流涕清涕服脾其
淚汪汪面浮腫雙腮赤惡心乾嘔穢臭耳但見此候即是疹子便宜
迎風寒戒葷腥厚味用藥以表散之使皮膚通暢腠理開而疹毒易出
○一論疹之初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩宜

升麻葛根湯

升麻

乾葛

白芍各一錢

甘草五分

右剉生薑水煎服加紫蘇薄荷以解肌切忌大汗斑不結者亦宜乃疹
疹初起之神方也

○一論麻疹既出下月而又沒有乃為風寒所抑麻毒內攻若不治胃爛
而死可用

消毒飲

鼠粘子四錢 荊芥二錢 甘草生一錢 防風去蘆半錢

右剉水煎服加烏犀角尤妙

○一論麻疹已出而復沒或出不盡心驚哭啼不正十分危急死在須臾或下痢腹痛可用

三仙湯 鄆陵劉孟門傳

黃芩去朽 白芍藥生用 各等分水煎溫服如神

○一論麻疹已出證語煩燥作渴者可用

白虎解毒湯

石膏

知母

黃連

黃芩

黃柏

梔子

甘草

右剉水煎服

○一論麻疹已出大小便閉可服

防風通聖散方見中風門

○一論麻疹已出證語小便閉者宜

導赤散

生地黃 木通 甘草 淡竹葉七片 水煎服。

○一論麻疹已出泄瀉不止可服。

四苓散

猪苓 澤瀉 白朮 去蘆 白茯苓各等分 水煎服。如小便如清

者。或小便不通者。加車前木通。

○一論麻疹已出寒熱似癰可服。

柴苓湯

柴胡 黃芩 半夏 猪苓 澤瀉 白朮 去蘆

白茯苓 去皮 甘草

右剉薑棗煎服。

○一論麻疹已出太便下血。或小便下血吐血。衄血。或二便閉澀。疹稠

密熱渴赤痛。

犀角解毒湯

真犀角 升麻 如無 生地黃五分 牡丹皮 一錢 赤芍 一錢

黃連 枯黃芩 黃柏 梔子 右剉水煎服。

如吐血衄血。加炒山梔子。通便和服。

○一論麻疹前後有熱潮不退等症。並為血虛。血熱可服。

四物湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃 血虛用熟地熱用生

右剉水煎服。○發渴加麥門冬犀角汁。○嗽加瓜蒌霜。○有痰加貝母陳皮去白。

○一論麻疹正出之時。雖不進飲食。得麻疹淡紅潤澤。莫正不爲害也。蓋熱毒未解。內蘊實熱。自不必急退。後若不愈。常隨用四物湯加神麴砂仁一二帖。決能食矣。如胃氣虛者。甚少下地黃。

○一論麻疹既出之時。如色紅紫乾燥。晦暈乃火盛毒熾。宜四物湯用生地黃加紅花酒炒黃芩。

○一論麻疹既出已過三日。不能沒者。乃內有虛熱。宜用四物湯進之。如失血之症。加犀角汁。

○一論麻疹退後。若有牙根腐爛。鼻血橫行。並爲失血之病。忌用四物湯。加茵陳木通生犀角之類。以利小便。使熱下行。如赤白帶下。

不治之症也。

○一論麻退之後。須避風寒。戒水濕。如或不謹。遂致終身之咳。嗽患無有愈也。

○一論麻疹。前後大忌。猪肉、魚、酒、雞子之類。恐惹終身之咳。只宜用老雞精肉、煮食。少助滋味可也。

○一論孕婦出麻。當以四物湯中加白芍。不食全艾葉。安胎清熱為主。則胎失無患。且忌食瓜、菜、如胎氣上冲。忌用中根艾葉煎湯。產後橫痃服之。更以四物湯大進之。

○一論疹子沒後。餘熱內攻。循衣摸床。譫言妄語。神昏喪志者。死。如熱輕餘毒未除。必先用諸氣色。雖預防之。始終以升麻葛根湯為主。或消毒飲。解時隨症選用。仍忌魚腥葱蒜之物。

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子

水煎溫服。

補遺

十仙湯

序班孫雙泉傳

治痧後餘毒

柴胡

葛根

玄參

黃連

黃芩

梔子

陳皮

茯苓

枳殼

生地黃

右生薑煎服

○小兒痧症。腹脹喘急。煩燥泄瀉。唇白青黑。買蘭峰傳

黃芩

黃芩

連翹

玄參

知母

桔梗

杏仁

白芍

麻黃

牛蒡子

乾葛

陳皮

厚朴

甘草

右劉水煎服